FAKULTETA
ZA ZDRAVSTVENE
VEDE V CELJU

ZBIRKA SCENARIJEV ZA IZVAJANJE SIMULACIJ V NUJNI MEDICINSKI POMOČI

Branko Kešpert

Celje, 2026

ZBIRKA SCENARIJEV ZA IZVAJANJE SIMULACIJ V NUJNI MEDICINSKI POMOČI

Naslov publikacije
Zbirka scenarijev za izvajanje simulacij v nujni medicinski pomoči

Avtor
viš. pred. Branko Kešpert

Recenzenta
izr. prof. dr. Gorazd Voga, izr. prof. dr. Igor Karnjuš

Urednica
Alenka Presker Planko

Izdaja
2026

Ime in sedež založnika
Fakulteta za zdravstvene vede v Celju
Mariborska cesta 7, 3000 Celje

Oblikovanje
Inicial d.o.o.

Spletna lokacija publikacije
https://www.fzvce.si/zbirka-scenarijev/

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili
v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID 300777475
ISBN 978-961-6889-64-3 (PDF)

KAZALO VSEBINE

UPORABA KRATIC 4

SPREMNA BESEDA 5

MATERIALNA SREDSTVA ZA IZVEDBO SIMULACIJSKEGA UČENJA 6

NETEHNIČNE VEŠČINE 8

SCENARIJI OSKRBE ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA PACIENTA 9

Pristop in oskrba življenjsko ogroženega poškodovanca 9

Pristop in oskrba kritično bolnega odraslega pacienta 29

Pristop in oskrba kritično bolnega otroka 63

Pristop in oskrba življenjsko ogroženega novorojenčka 85

SCENARIJI TEMELJNIH IN NAPREDNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA 94

Scenariji temeljnih in naprednih postopkov oživljanja pri odrasli osebi 94

Scenariji temeljnih in naprednih postopkov oživljanja pri otroku 112

LITERATURA 122

UPORABA KRATIC

ABCDE – A – dihalna pot (ang. Airway), B – dihanje (ang. Breathing), C – krvni obtok (ang. Circulation), D – nevrološko stanje (ang. Disability), E – celoten pregled, (ang. Exposure)
ADH – alkoholna dehidrogenaza
AED – avtomatski zunanji defibrilator
ALS – napredni postopki oživljanja odraslih
ASA – acetilsalicilna kislina
AVPU – akronim hitre ocene zavesti (A – buden, V – odziven na glas, P – odziven na bolečino, C – neodziven)
CO_2 – ogljikov dioksid
CPAP – ventilacija s kontinuiranim pozitivnim tlakom
ECMO – zunajtelesna membranska oksigenacija
EF – ejekcijska frakcija
EKG – elektrokardiogram
$ETCO_2$ – kapnografija
ETI – endotrahealna intubacija
FD – frekvenca dihanja
GCS – Glasgowska lestvica kome
HNMP – helikopterska nujna medicinska pomoč
IKT – znotraj lobanjski tlak
ITLS – mednarodno združenje za oskrbo poškodovancev
KOPB – kronična obstruktivna pljučna bolezen
KT – krvni tlak
NILS – napredni postopki oživljanja in oskrbe novorojenčkov
NMP – nujna medicinska pomoč
PLS – napredni postopki oživljanja otrok
PTCA – perkutano transluminalno koronarna angioplastika
PEA – električna aktivnost srca brez utripa
RSI – endotrahealna intubacija s hitrim zaporedjem postopkov
SAMPLE – S – simptomi, A - alergije, M – zdravila, P – znane bolezni, L – čas zadnjega obroka, E - opis dogodka
SaO_2 – nasičenost arterijske krvi s kisikom
SF – srčna frekvenca
STEMI – akutni miokardni infarkt z dvignjeno spojnico ST
SVT – supraventrikularna tahikardija
TPO – temeljni postopki oživljanja
TXA – traneksamijska kislina
VAS – vizuelno analogna lestvica bolečine
VF – ventrikularna fibrilacija
V_t – dihalni volumen
VT_p – ventrikularna tahikardija brez utripa
VUZ – vozilo urgentnega zdravnika

SPREMNA BESEDA

„Vsaka odločitev, vsak postopek, vsak trenutek šteje – ker rešiti eno življenje, pomeni spremeniti svet.“

V medicini je reševanje življenjsko ogroženih pacientov ena izmed najzahtevnejših in hkrati najbolj dragocenih nalog. Hitro prepoznavanje kritičnega stanja, pravilno ukrepanje in pravočasna oskrba lahko pomenijo razliko med življenjem in smrtjo. Priročnik, ki združuje scenarije za oskrbo življenjsko ogroženih odraslih, otrok, novorojenčkov in poškodovancev, je dragocen pripomoček za izvajanje simulacijskega učenja in prispeva k izboljšanju kliničnih kompetenc izvajalcev zdravstvene nege.

V sodobni medicinski praksi se vse bolj zavedamo, da teoretično znanje ni dovolj. Potrebna so praktična orodja, ki simulirajo realne situacije, omogočajo vadbo in izboljšujejo odločitvene procese ter timsko delo. Ta priročnik je zasnovan kot most med teorijo in prakso – med znanjem in ukrepanjem. Njegov koncept temelji na interaktivnih scenarijih, ki bralcem omogočajo, da se postavijo v vlogo reševalca, razmišljajo in ukrepajo v skladu z najnovejšimi smernicami ter tako razvijajo svoje klinične veščine.

Obravnava odraslih pacientov, otrok, novorojenčkov in poškodovancev prinaša raznolikost in izzive, ki zahtevajo prilagodljivost, natančnost in multidisciplinaren pristop. Vsak scenarij je zasnovan tako, da spodbuja kritično razmišljanje, povečuje samozavest bralcev in jih pripravlja na nepredvidljive situacije, s katerimi se srečujejo v klinični praksi.

Poleg izobraževalne vrednosti ima ta priročnik širši pomen. Predstavlja tudi priložnost za krepitev medsebojnega sodelovanja med zdravstvenimi strokovnjaki – zdravniki, medicinskimi sestrami, reševalci in drugimi člani tima. Učinkovita oskrba življenjsko ogroženega pacienta je mogoča le s sinhroniziranim delovanjem vseh, ki so vključeni v proces.

Naj vam priročnik služi kot navdih za nenehno učenje, rast in predanost reševanju človeških življenj.

viš. pred. Branko Kešpert, mag. zdr. nege

MATERIALNA SREDSTVA ZA IZVEDBO SIMULACIJSKEGA UČENJA

Vrsta pripomočka	Število	Potrošni material	Število
simulacijska lutka - odrasla	2 kosa	I-gel (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5)	2 kompleta
simulacijska lutka - otroška	1 kos	endotrahealni tubusi (2,5–9)	2 kompleta
simulator življenjskih funkcij	2 kosa	ustno-žrelni tubus (0–5)	2 kompleta
model roke za vzpostavitev proste venske poti	2 kosa	maska kisikova visoko koncentracijska	4 kosi
pribor za vzpostavitev i.o. poti (npr. NIO®, EZ-IO®)	1 komplet	maska kisikova - navadna	4 kosi
zajemalna nosila z oporo za glavo in pasovi	1 komplet	maska kisikova - Venturi	4 kosi
vratna opornica za odrasle	2 kosa	filtri za dihalni sistem	4 kosi
vratna opornica za otroke	2 kosa	fiksator za endotrahealni tubus	4 kosi
medenični pas (M)	1 kos	brizge (2, 5, 10, 20 ml)	10 kosov
Esmarchova preveza (npr. SAM®, CAT®)	2 kosa	igle (1,2; 0,8; 0,6)	10 kosov
laringoskop z lopatkami različnih velikosti	2 kompleta	trikanalni petelinček	4 kosi
ventilator za izvajanje mehanske ventilacije	1 kos	NaCl 0,9 % 500 ml	4 kosi
dihalni balon za odrasle (1500 ml)	2 kosa	NaCl 0,9 % 100 ml	4 kosi
dihalni balon za otroke (500 ml)	2 kosa	Ringerjev laktat 500 ml	4 kosi
pribor za konikotomijo (otroški in odrasli)	1 komplet	glukoza 5 % 100 ml	4 kosi
igla za razbremenilno punkcijo pnevmotoraksa	2 kosa	glukoza 10 % 500 ml	2 kosa
slušalke	2 kosa	infuzijski sistem	4 kosi
obrazne dihalne maske (1–5)	2 kompleta	venske kanile (vse velikosti)	10 kosov
kisikova jeklenka 2 l	2 kosa	fiksator venske kanile	20 kosov
preveza za odvzem krvi	4 kosi	epruvete za krvne vzorce	4 kosi
pribor za odvzem krvi	2 kompleta	razkuževalni robčki za kožo	20 kosov
merilec krvnega sladkorja	2 kosa	povoji (6 cm, 8 cm, 10 cm)	10 kosov
merilec krvnega tlaka	2 kosa	gaza (0,4 m; 0,8 m)	10 kosov
EKG aparat	1 kos	trikotna ruta	10 kosov
oksimeter	2 kosa	čistilni in razkužilni robčki	4 kosi
označevalni brezrokavniki za množične nesreče	10 kosov	zaščitne rokavice (S, M, L)	2 kompleta
Pean veliki	4 kosi	zaščitna očala	4 kosi
škarje	2 kosa	ampulirana zdravila	različna zdravila s hitrim učinkom
kartončki poškodovancev	50 kosov		

Vrsta pripomočka	Število	Potrošni material	Število
tabla za pisanje	2 kosa		
računalnik	2 kosa		
zaslon	2 kosa		
flomastri za belo tablo	2 kompleta		
zaščitne podloge za tla	2 kosa		
avtomatski zunanji defibrilator	2 kosa		
perfuzor	1 kom.		

*Zdravila in infuzijske tekočine, ki so navedene v scenarijih, se pripravljajo v ustreznih odmerkih in aplicirajo na odrejen način izključno po zdravnikovem naročilu.

*Posege, ki niso del strokovnih kompetenc medicinske sestre, izvaja zdravnik ali ustrezno strokovno usposobljen zdravstveni delavec s specializacijo ali uradnim dovoljenjem za izvajanje postopka.

NETEHNIČNE VEŠČINE

Netehnične veščine so socialne, kognitivne in osebne veščine, ki vplivajo na način, kako izvajamo tehnične veščine in postopke na intervenciji. Te veščine lahko vadimo in tako pripravimo osebje pri izvajanju intervencije na to, kako se spopasti z veliko količino časovno kritičnih podatkov, preprečiti napake in povečati varnost pacientov.

Komunikacija je medosebni proces, ki se ves čas odvija na različnih stopnjah učinkovitosti, in ki mora imeti enak pomen za celo ekipo. To je ključno za vse netehnične veščine, saj le tako člani ekipe razumejo ključne prioritete in vodja ekipe takoj prejme relevantne informacije. Čeprav je velik delež komunikacije verbalen, je tudi neverbalna komunikacija, govorica telesa, pomembna. Poskrbeti moramo, da so vsa sporočila jasna in nedvoumna. Faze komunikacije delimo na komunikacijo:

- pred prihodom pacienta (ali do pacienta) – »brifing« ekipe oziroma sestanek ekipe,
- med intervencijo,
- po odhodu pacienta – »debrifing« ekipe – pogovor po intervenciji.

Reanimacijski timi so akcijske ekipe, sestavljene iz osebja različnih specialnosti, ki ne vadijo skupaj, člani se pogosto spreminjajo, sestavijo se tik preden morajo delati, večinoma v situacijah, ko je pacient v kritičnem stanju oziroma brez znakov življenja in morajo izvajati hitro in pravilno oskrbo pacienta.

»Brifing« ekipe: Prva naloga potrebna za učinkovito delo ekipe je, da se člani predstavijo z imenom. Uporaba značk z imenom pomaga, da je jasno, komu se naloga dodeli. Ključni faktor »brifinga« ekipe je, da vodja ekipe poskrbi, da imajo vsi člani ekipe enako predstavo o stanju pacienta in vedo, kaj bo potrebno storiti. Za ustvarjanje takega skupnega mentalnega vzorca je potrebna komunikacija v obe smeri, da lahko člani ekipe postavljajo vprašanja in razjasnijo nejasnosti. S tem se izoblikuje osnovni načrt in razdelijo vloge ter naloge glede na kompetence prisotnih članov. Ker pa je predhodna informacija s terena omejena in se lahko stanje pacienta spremeni, je potrebno pripraviti tudi alternativni načrt.

Med intervencijo: Vsi člani ekipe morajo sodelovati pri izmenjavi informacij. Poleg pozornega, aktivnega poslušanja je pomembno tudi odgovarjanje ob pravem času in razjasnjevanje informacij. Strukturirani in jedrnati komunikacijski orodji, kot sta SBAR in ATMIST, omogočata hitro posredovanje bistvenih in natančnih informacij o ključnih vprašanjih, s čimer se zmanjša število napak in zagotovi skupen miselni model. K učinkoviti komunikaciji prispeva tudi vodja ekipe, ki poskrbi, da imajo vsi člani sproti nove informacije o stanju pacienta in tudi o nadaljnjih korakih, zlasti pa o spremembah načrta. Svetuje se uporaba komunikacije »v sklenjeni zanki«.

- Informacija naj bo jasna, kratka in natančna.
- Podana naj bo neposredno določeni osebi, z uporabo imena in očesnega stika.
- Oseba, ki je sprejela navodilo, naj ga ponovi.
- Oseba, ki je sprejela navodilo, poroča, ko je naloga izvedena.
- Izogibamo se pogovoru o podatkih, ki se ne tičejo tega pacienta.

»Debriefing« ekipe – razbremenilni pogovor po intervenciji: Pogovor po intervenciji je analiza dogodka in omogoča izboljšanje dela ekipe v prihodnosti. Pogovor mora potekati brez iskanja krivde in vsi člani morajo biti enakovredno vključeni. Poudariti je treba dobre odločitve in izvedbo nalog, popraviti napake in najti boljše rešitve za naprej. Pogovor lahko poteka v dveh fazah. Takojšnji »vroči debriefing« oziroma razbremenilni pogovor omogoča zmanjševanje čustvenih odzivov na travmatične dogodke, razjasnitev okoliščin, misli, čustev in normalizacijo doživljanj. Praviloma se ga udeležijo člani ekipe, ki jim pogovor omogoča lažje funkcioniranje po kritičnem dogodku, olajša čustveno breme in zmanjšuje možnosti za hujše psihološke posledice. Tako imenovani »hladni debriefing«, ki se izvede pozneje in se ga lahko udeležijo tudi drugi člani enot, pa je usmerjen v strokovna vprašanja in je učni dogodek.

SCENARIJI OSKRBE ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA PACIENTA

PRISTOP IN OSKRBA ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA POŠKODOVANCA

Učni cilji

Po zaključku scenarijev bo udeleženec zmožen:

- ☐ razdeliti ključne vloge v timu in uporabiti jasno timsko komunikacijo;
- ☐ oceniti varnost kraja dogodka, mehanizem poškodbe in potrebo po dodatnih ekipah glede na klinični problem;
- ☐ izvesti začetno oceno, pri tem uporabiti pristop CABCDE/ABCDE in oskrbo po načelu ITLS ter utemeljiti odločitev med usmerjenim in celotnim pregledom poškodovanca;
- ☐ prepoznati klinične znake neposredne življenjske ogroženosti ter določiti prednostno zaporedje ukrepov in izvesti postopke in posege v skladu s kompetencami ali po naročilu zdravnika;
- ☐ zagotoviti zadostno ventilacijo in oksigenacijo ter analgezijo po naročilu zdravnika, preprečiti krvavitve in izvesti varen transport v okviru kompetenc;
- ☐ zagotoviti kontinuiran monitoring, ustrezno imobilizacijo, najavo sprejemni ustanovi in strukturirano predajo pacienta.

Strokovna priporočila in smernice

Scenariji se nanašajo na priporočila Mednarodnega združenja za oskrbo poškodovancev ITLS (ang. International Trauma Life Support).

Splošna vprašanja ob koncu vsakega scenarija

- Kateri podatki so vas najprej usmerili k pravilni prepoznavi kliničnega problema v scenariju?
- Kateri ukrep je bil v prvih minutah časovno najbolj kritičen in zakaj ste ga izvedli v izbranem zaporedju?
- Kje v tem scenariju bi lahko nastala najpomembnejša varnostna napaka in kako bi jo preprečili?
- Kako je potekala razdelitev vlog, komunikacija znotraj tima in predaja informacij ter kaj bi ob ponovitvi scenarija izvedli drugače?

SCENARIJ 1/01: VBODNA POŠKODBA

Klic 112: Dispečerski center zdravstva vam posreduje naslednje aktivacijsko sporočilo: *»Hotel Donat – Rogaška Slatina, v moškem stranišču je zaboden mlajši moški, pri zavesti, diha. Napadalec je na begu, zasleduje ga policija.«*

Stanje poškodovanca ob prihodu: Ob prepiru zaboden moški, v spodnji desni zadnji predel prsnega koša, iz rane rahlo krvavi, nož je čvrsto fiksiran, dostop do poškodovanca otežen.

Vitalni znaki: zavest – A, GCS – 15, FD – 24 vdihov/min, SaO_2 – 90 %, SF – 110 utripov/min, KT – 120/80 mmHg, stanje kože – bleda, potna, kapilarna polnitev – 3 s, rahlo podaljšana, zenici – enako široki, reaktivni na svetlobo, EKG – sinusna tahikardija, glukoza – 7 mmol/l.

SAMPLE:

S: srednje huda bolečina (VAS 6/10), ko vdahne ga zapeče v predelu prsnega koša,

A: 0,

M: 0,

P: 0,

L: pred 30 minutami,

E: orientiran.

PRISTOP: Ob prihodu na mesto dogodka je varnost zagotovljena, policija je na mestu dogodka, uporabimo opremo za oskrbo poškodovanca, uporabimo zaščitna sredstva, eden poškodovanec, mehanizem poškodbe – vbodna poškodba, dodatnih ekip trenutno ne potrebujemo.

SPLOŠNI VTIS: moški, star 30 let, sedi ob steni stranišča, zunanjih nekontroliranih krvavitev ni zaznati, deformacij ni vidnih, je pogovorljiv.

ZAČETNA OCENA: pristop s sprednje strani, varovanje vratne hrbtenice, ocena ABC.

- **Zavest**: pri zavesti, dogodek opiše (A).
- **A**: odprta dihalna pot, normalno se pogovarja.
- **B**: dihanje pospešeno 24 vdihov/min – kisik.
- **C**: utrip na radialni arteriji tipen, rahlo pospešen 110/min, koža bleda – vzpostavimo prosto i.v. pot.

ITLS pregled: glede na mehanizem poškodbe izvedemo **usmerjen pregled**.

USMERJEN PREGLED:

- **Vrat**: vratne vene normalno polnjene, traheja v srednjem položaju.
- **Prsni koš**: spredaj brez vidnih poškodb, desna stran se dviga slabše, palpacija brez krepitacij, avskultatorno dihanje slišno slabše desno, levo normalno, perkusija na obeh straneh normalna, srčni toni so normalno slišni.
- **Hrbet**: desno spodaj zaboden nož.

Ukrepi:

1. Dovajanje kisika preko kisikove maske z rezervoarjem in nepovratnim ventilom 15 l/min.
2. Stabilizacija noža s pomočjo gaz in povojev.
3. Ukrepi za preprečevanje zunanje/notranje nekontrolirane krvavitve.
4. Nastavitev proste i.v. poti.
5. Aplikacija analgetika po zdravnikovem naročilu.
6. Nastavitev 500 ml 0,9 % NaCl – vzdrževanje tipnih perifernih utripov.
7. Prenos poškodovanca v reševalno vozilo, transportni položaj na boku, levo.

KONTROLNI PREGLED:

- Zaradi resnosti poškodbe kontrolni pregled na **5 minut** – penetrantna poškodba prsnega koša.
- Ocena zavesti in ABC.
- Preverimo stabilnost tujka v prsnem košu in tesnjenje obveze.
- Izvajajmo kontinuirani monitoring: dihanje, oksimetrija, srčna akcija, merjenje krvnega tlaka, EKG in ocena bolečine.
- Najava v urgentni center sprejemne bolnišnice.

DISKUSIJA

Penetrantne poškodbe prsnega koša so kritične travmatske poškodbe, ki vključujejo predrtje prsne stene in potencialno vdor v plevralno votlino, pljuča ali mediastinuma. Takšne poškodbe pogosto povzročijo bodala, projektili strelnega orožja ali drugi ostri predmeti. Na terenu je prioriteta stabilizacija pacienta in preprečevanje nadaljnjih zapletov.

Ključni principi oskrbe na terenu

Ocena življenjskih znakov in ABC: Pri poškodovancu smo pozorni na znake hipoksije, dihalne stiske, šoka ali srčnega zastoja.

Nujna oskrba odprtih ran:

1. Pri odprtih penetrantnih poškodbah prsnega koša obstaja tveganje za nastanek odprtega pnevmotoraksa („sucking chest wound“).
2. Rana se nemudoma pokrije s sterilnim, neprepustnim materialom, ki deluje kot enosmerni ventil. Material pritrdimo na treh robovih, da omogoči enosmerno izhajanje zraka iz prsne votline, medtem ko obloga preprečuje vstop zraka v prsno votlino. Uporabijo se lahko že tovarniško pripravljeni pripomočki.

Prepoznava življenjsko nevarnih stanj:

1. Tenzijski pnevmotoraks: Prepoznamo ga po kliničnih znakih, kot so huda dihalna stiska, napete vratne vene, mediastinalni premik, hipersonorna perkusija na poškodovani strani prsnega koša in hitro hemodinamično poslabšanje.
2. Hematotoraks: Nanj pomislimo ob šokovnem stanju, slabše slišnem dihanju na prizadeti strani in zamolkli perkusiji na poškodovani strani prsnega koša.

Celoten pregled/usmerjen pregled poškodovanca: Kakšen pregled bomo opravili pri poškodovancu je odvisno od mehanizma nesreče (generaliziran mehanizem nesreče – celoten pregled; nevaren ali nenevaren, zanesljivo omejen mehanizem nesreče – usmerjen pregled. Pri vseh poškodovancih z moteno zavestjo in/ali generaliziranim mehanizmom nesreče delamo praviloma celoten pregled poškodovanca.

1. Pri usmerjenem pregledu praviloma pregledamo **tudi sosednje regije od mesta poškodbe**.
2. Način transporta poškodovanca **s tujkom v hrbtu**: Poškodovanca, ki je zaboden v hrbet, načeloma imobiliziramo in transportiramo na boku, tudi ob moteni zavesti.

Če je tujek spredaj, tujek stabiliziramo in pacienta transportiramo leže.

1. **Kdaj lahko tujek odstranimo?** Le v primeru potrebe po oživljanju ali če je zaradi tujka ogrožena dihalna pot.

SCENARIJ 1/02: MANJŠA POŠKODBA GLAVE IN ZASTRUPITEV S PSIHOAKTIVNIMI SUBSTANCAMI (OPIATI)

Klic 112: Dispečerski center zdravstva vam posreduje naslednje aktivacijsko sporočilo: *»Na železniški postaji v Žalcu leži nezavestna oseba, komaj diha.«*

Anamneza:

S: /

A: /

M: /

P: /

L: /

E: /

Stanje poškodovanca ob prihodu: Na železniški postaji v čakalnici leži na hrbtu na klopi moški**,** velika razpočna rana na glavi, iz katere nekoliko krvavi, sum na prevelik odmerek opiatov. Številni vbodi po rokah, vidni stari sledovi vreznin na obeh zapestjih.

OCENA KRAJA NESREČE: varno mesto dogodka, ena oseba, mlajši moški, mehanizem ni znan.

ZAČETNI PREGLED:

- Pristop s sprednje strani, varovanje vratne hrbtenice.
- **Splošni vtis**: leži na hrbtu, zanemarjen, nezavesten, večjih krvavitev ni videti, patoloških položajev okončin ni.
- **Zavest**: se ne odziva, tudi na bolečinski dražljaj ne (AVPU-U).
- **A**: smrči – sprostitev dihalne poti z ročnim prilagojenim trojnim manevrom.
- **B**: frekvenca dihanja 5/min, cianoza – asistirana ventilacija z obrazno masko in ročnim dihalnim balonom ter 100 % kisikom.
- **C**: pulza na a. radialis in a. karotis dobro tipna, frekvenca 100/min, koža izrazito cianotična – lahko nastavitev proste periferne i.v. poti (pred posegom pregled roke).

ODLOČITEV: hitri celoten pregled poškodovanca (glede na nejasen mehanizem in začetni pregled).

CELOTEN PREGLED POŠKODOVANCA:

1. **Glava**: razpočna rana na glavi, ki še nekoliko krvavi – oskrba rane, tretji član ekipe.
2. **Vrat**: brez vidnih ali tipnih poškodb; traheja na srednjem položaju; vratne vene primerno polnjene – namestitev vratne opornice.
3. **Prsni koš**: simetrično gibanje prsnega koša ob dihanju, brez vidnih poškodb, palpacija brez krepitacij, avskultatorno dihanje normalno slišno na obeh straneh, srčni toni dobro slišni.
4. **Trebuh**: brez vidnih poškodb, palpacija – mehak trebuh, ob pregledu ne dela grimas.
5. **Medenica**: pritisk na simfizo in stis medenice neboleča, stabilna:
6. **Spodnje okončine:** brez poškodb, na ščipanje ne reagira.
7. **Zgornje okončine**: brez svežih poškodb, vidni stari sledovi vreznin na zapestju, ob dvigu rokavov se opazijo številni sledovi vbodov, na ščipanje ne reagira – obračanje v osi na bok.
8. **Hrbet**: razkritje in palpacija – brez vidnih poškodb.

ODLOČITEV: »load and go« – imobilizacija na zajemalna nosila/dolgo desko.

NADALJNJA OBRAVNAVA:

Vitalni znaki: KT – 130/80, SF – 100/min, SaO_2 – 94 %, FD – asistirana ventilacija.

Nevrološki pregled: GCS 3, zenici ozki, ne reagirata na svetlobo, ne reagira na bolečino, glukoza 7,1 mmol/l.

Ukrepi:

- monitoring (EKG, pulzna oksimetrija);
- i.v. kanal (če ni že na terenu), tekočinska terapija – vzdrževanje proste periferne venske poti;
- aplikacija antidota Nalokson (Nexdonal) po zdravnikovem naročilu 0,4 mg i.v. v bolusu; v primeru, da se stanje ne izboljša, lahko enak odmerek ponovimo na 2–3 minuti.

Po naloksonu se prebudi, začne zadovoljivo dihati, hoče agresivno vstati in izpuliti i.v. poti. Potrebno verbalno pomirjanje.

KONTROLNI PREGLED:

- Zaradi resnosti stanja na **5 minut** – možna ponovna depresija dihanja.
- Ocena zavesti in ABC.
- Kontrola oskrbe rane na glavi.
- Izvajamo kontinuirani monitoring: stanje zavesti, dihanje, oksimetrija, srčna akcija, merjenje krvnega tlaka, EKG in ocena bolečine.
- Najava v urgentni center sprejemne bolnišnice.

Diagnoze:

- predoziranje s heroinom,
- razpočna rana na glavi,
- stare poškodbe – sledovi vbodov, stare vreznine na zapestjih.

DISKUSIJA

1. **Transport** oseb predoziranih z opiati je obvezen, ker je učinek antidota Naloksona (Nexodal) krajši kot učinek opiata; razpočna rana na glavi – razmislimo tudi o možnosti sekundarne poškodbe glave.
2. **Nezavestna oseba**: opazujmo grimase obraza ob pregledu, bolečinski odziv ob preverjanju senzorike in motorike okončin.
3. **Vpliv drog in alkohola**: osebe s predoziranjem s psihoaktivnimi substancami ali alkoholom imajo pogosto motnjo zavesti, ob sočasni poškodbi je težko oceniti razlog za znižano stopnjo zavesti. Če posumimo na sočasno uporabo psihoaktivnih substanc, uporabimo antidot, npr. opiati – Naloxon 0,4 mg (Nexodal); benzodiazepini – Flumazenil 0,2 mg (Anexate).
4. **Obračanje v osi med umetno ventilacijo** zahteva usklajeno delo, primarni cilj je zagotoviti ustrezno umetno ventilacijo in oksigenacijo!
5. **Pogovor z osebo pod vplivom psihoaktivnih substanc:** uporabljamo zaprti tip vprašanj, ker imajo ti pacienti znižano stopnjo koncentracije (pri zaprtem tipu vprašanj pacient lahko odgovori samo z »da« ali »ne«).

SCENARIJ 1/03: SEDEČ POŠKODOVANEC S POLITRAVMATSKO POŠKODBO

Klic 112: Dispečerski center zdravstva vam posreduje naslednje aktivacijsko sporočilo: *»Prometna nesreča, ukleščen poškodovanec, trk v drevo, policija in gasilci so na poti.«*

Anamneza:

S: vse ga boli, ne ve, kaj se je zgodilo, ponavlja ista vprašanja,

A: ne,

M: pumpice,

P: astma,

L: ne ve,

E: ne ve.

Poškodbe: buška na čelu, pretres možganov, kontuzija prsnega koša levo, zlom stegnenice levo, zlom gležnja desno, udarnina trebuha z notranjo krvavitvijo, hemoragični šok.

OCENA KRAJA NESREČE:

- Policija je že zavarovala mesto nesreče in gasilci se pripravljajo na tehnični poseg na vozilu;
- samo eden poškodovanec – voznik, moški star 25 let;
- mehanizem: zaletel se je v drevo, bil je privezan, zračna vreča je aktivirana. Avto je zelo poškodovan, razbita sprednja šipa;
- gasilci potrebujejo vašo pomoč pri varovanju poškodovanca, da bodo lahko varno izvedli tehnično reševanje poškodovanca.

ZAČETNI PREGLED:

- Pristop skozi voznikova vrata iz sprednje strani k poškodovancu, varovanje vratne hrbtenice.
- **Splošni vtis**: nagnjen z glavo na volan, večjih zunanjih krvavitev ni videti, patoloških položajev okončin ni.
- **Zavest**: na klic odpre oči in odgovarja zmedeno na vaša vprašanja (AVPU-V).
- **A**: lahko govori, dihalna pot je odprta.
- **B**: dihanje pospešeno 35/min – aplikacija 100 % kisika.
- **C**: pulz a. radialis komaj tipen, močno pospešen; koža hladna, bleda, potna – lahko i.v. kanal (prej pregled roke).

POSTOPEK HITREGA IZNOSA IZ VOZILA S POMOČJO ZAJEMALNIH NOSIL

Pred postopkom namestimo vratno opornico – izjemoma brez pregleda vratu, pregledamo hrbet – brez vidnih poškodb, palpatorna občutljivost v predelu ledvene hrbtenice, brez deformacij. Pred izvlekom je potrebno preveriti motoriko in senzoriko okončin.

Ko obstajajo razlogi za hiter iznos poškodovanca iz vozila, prvi reševalec (vodja tima oziroma intervencije) pristopi do poškodovanca v njegovem vidnem polju

- in mu z obema rokama zavaruje glavo in vratno hrbtenico v nevralnem položaju;
- ga ogovori in oceni njegovo stanje zavesti po lestvici AVPU;
- drugi reševalec vstopi v vozilo in poškodovancu s hrbtne strani prevzame ročno varovanje vratnega dela hrbtenice;

- prvi reševalec ima zdaj proste roke in opravi začetno oceno poškodovanca - po potrebi sprosti dihalno pot in oceni dihanje, oceni krvni obtok s pomočjo tipanja perifernih in/ali centralnih utripov ter oceni barvo in toploto kože;
- po oceni življenjskih funkcij prvi reševalec preveri še občutljivost in gibljivost na okončinah, kar ponovi tudi kasneje po hitrem iznosu poškodovanca;
- četrti reševalec pripravi zajemalna nosila (z najkrajšo možno dolžino) ali dolgo desko;
- zajemalna nosila s pomočjo prvega reševalca potisne s strani pod poškodovanca in si jih namesti tako, da jih podpira z nogami v dimljah, roke pa iztegne in je pripravljen na prevzem varovanja glave s hrbtenico;
- tretji reševalec se poškodovancu približa s sopotnikove strani, mu osvobodi noge in ga pripravi za rotacijo;
- prvi reševalec prevzame ročno varovanje glave od drugega reševalca;
- drugi reševalec pristopi z voznikove strani nasproti prvega reševalca, prime poškodovanca preko ramen in sodeluje pri rotaciji poškodovanca in izvleku na zajemalna nosila;
- ko je poškodovanec nagnjen (poravnan) naprej in so noge osvobojene, vsi trije reševalci z usklajenimi gibi obrnejo poškodovanca v osi, tako da noge dvignejo na sopotnikov sedež, hkrati pa poškodovanca s hrbtom obrnejo proti bližnjim vratom;
- ko je poškodovanec na nosilih, ga pomaknejo navzgor proti zgornjemu robu zajemalnih nosil;
- varovanje glave s hrbtenico prevzame četrti reševalec;
- prvi in drugi reševalec primeta nosila s strani in izneseta poškodovanca iz avta na varno in ga položita na tla;
- prvi reševalec hitro izvede kontrolni pregled poškodovanca (ponovna ocena ABC, motorike in senzorike okončin;
- zajemalna nosila nastavimo na primerno dolžino;
- opravimo celoten pregled poškodovanca (Andolšek, 2024).

ODLOČITEV: celoten pregled poškodovanca (glede na mehanizem nesreče in začetno oceno).

CELOTEN PREGLED POŠKODOVANCA:

1. **Glava**: buška na čelu.
2. **Vrat**: brez vidnih poškodb, palpatorno boleč, traheja na sredini, vratne vene prazne – odpnemo vratno opornico, da vodja pregleda vrat, nato jo tretji član ponovno namesti.
3. **Prsni koš**: simetrično gibanje prsnega koša ob dihanju, viden odtis varnostnega pasu, palpacija levo boleča, brez krepitacij, avskultatorno dihanje normalno slišno na obeh straneh, srčni toni slišni, pospešeni.
4. **Trebuh**: vidna udarnina, palpatorno napet in močno občutljiv.
5. **Medenica**: pritisk na simfizo neboleč, stis medenice neboleč, stabilen.
6. **Spodnje okončine**: deformacija leve stegnenice, krepitacije, krvavitev ni, goleni brez poškodb, motorika in senzorika normalni, tretji član ekipe (če je prost) prereže hlače, sezuje in preveri pulz, zaprt zlom gležnja desno, periferna pulza prisotna na obeh okončinah.
7. **Zgornje okončine**: brez poškodb.

ODLOČITEV: »load and go« situacija. Dokončna imobilizacija na dolgi deski oziroma zajemalnih nosilih.

NADALJNJA OBRAVNAVA:

VITALNI ZNAKI: KT – 75/30 mmHg , SF – 140/min, SaO_2 – 89 % (mrzli prsti), FD – 35/min.

NEVROLOŠKI PREGLED: GCS 12 (E3, V4, M5), zenici enako široki, normalno reagirata na svetlobo, senzorika in motorika okončin prisotni, glukoza 5,1 mmol/l.

KONTROLNI PREGLED:

- Zaradi resnosti stanja se izvaja na **5 minut**.

- Ocena zavesti in ABC.
- Izvajamo kontinuirani monitoring: stanje zavesti, dihanje, oksimetrija, srčna akcija, merjenje krvnega tlaka, EKG in ocena bolečine.
- 2 x i.v. pot, tekočinska terapija – vzdrževanje permisivne hipotenzije (infuzijska raztopina 0,9 % NaCl, Ringerjeva raztopina do tipnih perifernih pulzov.
- Analgezija; Ketamin (0,125–0,25 mg/kg) počasi titrirano, Piritramid (0,05–0,1 mg/kg) počasi titrirano.
- Najava v urgentni center sprejemne bolnišnice.

Diagnoze:

- zaprti zlom leve stegnenice,
- zaprti zlom desnega gležnja,
- poškodba trebuha,
- hemoragični šok,
- kontuzija prsnega koša,
- sum na kontuzijo srca,
- poškodba glave - pretres možganov.

DISKUSIJA

Tehnike iznosa poškodovanca iz vozila

Prva tehnika zajema uporabo **steznika za imobilizacijo sedečega poškodovanca**. Uporabimo jo takrat, ko poškodovanec ni življenjsko ogrožen, je stabilen in ko ni prisotnih niti potencialnih niti neposrednih nevarnosti, ki bi ogrožale poškodovanca in reševalni tim. Gre za nesreče, kjer ni prisotnih težjih mehanizmov poškodb.

Druga tehnika je **hiter iznos (angl. Rapid Extrication)**. To tehniko moramo uporabiti v primeru, ko imamo pri reševanju prisotno potencialno nevarnost, ki ogroža poškodovanca (npr. nezavest, šokovno stanje ...) in/ali reševalno ekipo (npr. razlito gorivo in potencialna nevarnost vžiga). Torej je lahko potencialna nevarnost zdravstvena težava ali pa tehnična ali kakšna druga nevarnost, ki ogroža poškodovanca in/ali reševalni tim.

Tretjo tehniko iznosa moramo uporabiti, ko poškodovancu in/ali reševalni ekipi preti neposredna nevarnost, ki ogroža njihovo zdravje in celo življenje. Govorimo o t. i. tehniki **urgentnega iznosa (angl. Urgent Extrication).** Gre za neposredno nevarnost, kjer je ogroženo življenje poškodovanca (npr. potreba po reanimaciji, huda krvavitev, ki je v trenutnem poškodovančevem položaju ne moremo nadzorovati ...) in/ali ekipe (npr. prisotnost požara, neposreden izpust nevarne snovi ...). Pri tej tehniki gre pravzaprav za Rautkov prijem, s katerim zajamemo poškodovanca in ga iznesemo iz vozila dovolj stran, da je to varno zanj in za reševalni tim, ki ga bo oskrboval.

ZAPISKI

SCENARIJ 1/04: POŠKODBA PRSNEGA KOŠA (NESTABILNI PRSNI KOŠ IN HEMATOTORAKS)

Klic 112: Dispečerski center zdravstva vam posreduje naslednje aktivacijsko sporočilo: *»Starejša voznica se je z avtomobilom bočno zaletela v betonski drog. Je pri zavesti, diha.«*

Anamneza:

S: težko diha,

A: ne,

M: veliko tablet – osteoporoza, visok pritisk, za spanje, za živce,

P: pritisk, sladkorna bolezen, na dieti, živci,

L: ne ve,

E: nič ne ve.

Poškodbe: nestabilni prsni koš levo s serijskim zlomom reber, hematotoraks levo, pretres možganov.

OCENA KRAJA NESREČE:

- Mesto dogodka je varno, gasilci so pogasili tlenje v vozilu; policija je zavarovala mesto nesreče;
- samo ena poškodovanka, 70-letna gospa, leži ob vozilu, očividci so jo izvlekli iz vozila iz katerega se je kadilo;
- mehanizem: zapeljala je s ceste in se bočno zaletela v betonski drog ob cesti.

ZAČETNI PREGLED:

- Pristop s sprednje strani k poškodovanki, varovanje vratne hrbtenice.
- **Splošni vtis**: leži ob avtomobilu, izrazito težko diha, cianotična, večjih krvavitev ni videti, patoloških položajev okončin ni.
- **Zavest**: pri zavesti, dogodka pa se ne spominja (AVPU-A).
- **A**: lahko govori samo posamezne besede, dihalna pot je odprta.
- **B**: pospešeno, plitvo dihanje 40/min, cianotična – aplikacija 100 % kisika.
- **C**: pulz a. radialis komaj tipen, 130/min, koža hladna, potna, cianoza – lahko i.v. kanal (prej pregled roke).

CELOTEN PREGLED POŠKODOVANKE:

1. **Glava**: buška na glavi.

2. **Vrat**: palpatorno boleč, brez vidnih ali tipnih poškodb; traheja v srednji poziciji; vratne vene prazne – namestimo vratno opornico.

3. **Prsni koš**: vidna kontuzijska značka na sredini, paradoksno gibanje velikega segmenta prsnega koša levo, palpacije levo ne bomo izvajali (saj že pri inspekciji vidimo, da gre za serijski zlom reber, s palpacijo bi poškodovancu zgolj povzročili hude bolečine), palpatorna bolečnost desno, avskultatorno dihanje levo praktično neslišno, desno slišno, perkusija levo zamolkla, srčni toni slišni, pospešeni – oskrba nestabilnega prsnega koša (čim prej, ker zelo moti mehaniko dihanja, najhitrejši način je ročna stabilizacija, alternativa stabilizacija s širokim lepilnim trakom).

4. **Trebuh**: brez vidnih poškodb, palpatorno neboleč, mehak.

5. **Medenica**: pritisk na simfizo neboleč, stis pelvisa neboleč, stabilen.

6. **Spodnje okončine**: brez poškodb, motorika in senzorika prisotni.

7. **Zgornje okončine**: brez poškodb, motorika in senzorika prisotni.

ODLOČITEV: »load and go« situacija in dokončna imobilizacija na dolgi deski oziroma zajemalnih nosilih.

NADALJNJA OBRAVNAVA:

VITALNI ZNAKI: KT – 70/30 mmHg, SF – 130/min, SaO_2 – 80 %, FD – 30/min.

NEVROLOŠKI PREGLED: GCS 13 (E4, V4, M5), zenici enako široki, normalno reagirata na svetlobo, senzorika in motorika prisotni, glukoza 7,1 mmol/l.

KONTROLNI PREGLED:

- Zaradi resnosti stanja na **5 minut**.
- Ocena zavesti in ABC.
- Izvajati kontinuirani monitoring: stanje zavesti, dihanje, oksimetrija, srčna akcija, merjenje krvnega tlaka, EKG in ocena bolečine.
- 2 x i.v. pot, tekočinska terapija – vzdrževanje permisivne hipotenzije (0,9 % NaCl, Ringer - do tipnih perifernih pulzov).
- Analgezija: Ketamin (0,125–0,25 mg/kg) počasi titrirano, Piritramid (0,05–0,1 mg/kg) počasi titrirano.
- Razmislimo o endotrahealni intubaciji/RSI (zdravila za RSI: Midazolam (Dormicum), Ketamin (Ketanest), Sukcinilholin, nato za vzdrževanje anestezije in relaksacije z Rocuronijem in Ketaminom.
- Najava v urgentni center sprejemne bolnišnice.

Diagnoze:

- nestabilni prsni koš levo, paradoksno gibanje prsnega koša,
- hematotoraks levo,
- hemoragični šok,
- poškodba glave – pretres možganov.

DISKUSIJA

1. **Nastanek paradoksnega gibanja prsnega koša in njegove posledice na ventilacijo:** O nestabilnem prsnem košu govorimo, če je prisoten zlom reber na dveh mestih, vsaj na treh sosednjih rebrih. S tem dobimo segment, ki ni povezan s preostalim delom prsnega koša, zato se med vdihom, ko se prsni koš razširi ta segment giblje v nasprotni smeri od preostalega prsnega koša in s tem moti mehaniko dihanja.
2. **Stabilizacija segmenta:** najhitrejši način je ročna stabilizacija ali stabilizacija z lepilnim trakom. Najboljši način stabilizacije segmenta pa je endotrahealna intubacija in umetna ventilacija. Pri umetni ventilaciji pacienta namreč ventiliramo s pozitivnimi tlaki (za razliko od spontanega dihanja, kjer v plevralnem prostoru nastane negativni tlak), tako razširimo prsni koš (tudi nestabilni segment se giblje tako kot preostali del prsnega koša).
3. Hematotoraks je notranja krvavitev, ki je ne moremo kontrolirati. Zato tekočine nadomeščamo le toliko, da vzdržujemo permisivno hipotenzijo. Dokončno oskrbo s torakalno drenažo izvajajo le v bolnišnicah.
4. Vse notranje krvavitve so nujne situacije, saj jih na terenu ne moremo kontrolirati (kirurški poseg je edina dokončna rešitev za takega poškodovanca.

Znaki hematotoraksa: hipovolemični šok (hipotenzija), respiratorna stiska. Pri avskultaciji pljuč ne slišimo dihanja na prizadeti strani, poklep je zamolkel, vratne vene so prazne.

SCENARIJ 1/05: POŠKODBA GLAVE (EPIDURALNI HEMATOM)

Klic: Dispečerski center zdravstva pošlje naslednje aktivacijsko sporočilo: *»Poškodovan mlajši moški, ki krvavi iz glave, nejasno govori, prijatelji so ga z osebnim vozilom pripeljali domov. Menda je padel preko škarpe. Klicatelj – oče je paničen.«*

Anamneza:

S: nič smiselnega ne pove,

A: ne (povedo starši),

M: ne (povedo starši),

P: ne (povedo starši),

L: starši ne vedo, cel večer ga ni bilo doma,

E: bil je na fantovščini (povedo starši).

Poškodbe: sum na epiduralni hematom, rana levo temporalno, ureznina na čelu – krvaveča. Oče pove, da je čedalje bolj zmeden in zaspan, ves čas leži.

OCENA KRAJA NESREČE:

- Dogodek doma, varno okolje;
- samo eden poškodovanec, 16-letni mladenič, ki leži na tleh;
- mehanizem: naj bi padel preko škarpe na glavo.

ZAČETNI PREGLED:

- Pristop s sprednje strani k poškodovancu, varovanje vratne hrbtenice.
- Splošni vtis: leži na hrbtu na tleh, krvav po obrazu, majici, rokah, večjih krvavitev ni videti, patološkega položaja okončin ni.
- Zavest: na klic odpre oči, smiselnega stavka ne zmore povedati (popolnoma zmeden, uporablja nejasne besede), sili ga na bruhanje (AVPU-V).
- A: lahko govori, dihalna pot je odprta.
- B: normalno dihanje, 14/min – aplikacija 100 % kisika.
- C: pulz a. radialis dobro tipen, 90/min, koža suha, topla – lahko i.v. kanal (prej pregled roke).

ODLOČITEV: hitri travma pregled (glede na neznan mehanizem in začetni pregled).

CELOTEN PREGLED POŠKODOVANCA:

1. **Glava**: krvaveča rana na čelu, levo temporalno kontuzijska značka, občutek krepitacij.

2. **Vrat**: palpatorno napet, grimase in stokanje ob palpaciji, brez vidnih poškodb; traheja na srednji poziciji; vratne vene primerno polnjene – namestitev vratne opornice.

3. **Prsni koš:** normalno gibanje prsnega koša ob dihanju, brez vidnih poškodb, palpacija neboleča, krepitacij ni, avskultatorno dihanje normalno slišno na obeh straneh, srčni toni dobro slišni.

4. **Trebuh**: brez vidnih poškodb, palpatorno mehak in neboleč.

5. **Medenica**: pritisk na simfizo neboleč, stis pelvisa neboleč in stabilen.

6. **Spodnje okončine**: brez poškodb, krepitacij, desno na ščipanje ne odreagira.

7. **Zgornje okončine:** brez poškodb, krepitacij, desno na ščipanje ne odreagira – obračanje na bok v osi.

8. **Hrbet**: brez poškodb.

ODLOČITEV: »load and go« situacija, dokončna imobilizacija na zajemalna nosila/dolgo desko.

NADALJNJA OBRAVNAVA:

VITALNI ZNAKI: KT – 120/70 mmHg, SF – 90/min, SaO_2 – 96 %, FD – 14/min.

NEVROLOŠKI: GCS 10 (E3, V3, M4), leva zenica široka, slabo reaktivna na svetlobo, desna ožja, reaktivna na svetlobo, glukoza 7,1 mmol/l; levostranska hemipareza.

KONTROLNI PREGLED:

- Zaradi resnosti stanja na 5 minut.
- Ocena zavesti in ABC.
- Izvajati kontinuirani monitoring: stanje zavesti, dihanje, oksimetrija (96 %), srčna akcija, merjenje krvnega tlaka, EKG (sinusna akcija, 90/min) in ocena bolečine.
- 2 x i.v. pot, tekočinska terapija – vzdrževanje normalnega sistoličnega krvnega tlaka (0,9 % NaCl, Ringer).
- Zdravila: analgetik, antiemetik.
- V primeru motnje zavesti dokončna oskrba dihalne poti.
- Najava v urgentni center sprejemne bolnišnice.

Diagnoza:

- Huda poškodba glave, epiduralni hematom (?).

DISKUSIJA

- **Akutni epiduralni hematom**: je običajno posledica poškodbe srednje meningealne arterije zaradi poškodbe lobanjskih kosti v temporalnem predelu. Gre za arterijsko krvavitev, ki hitro povzroči dvig intrakranialnega tlaka (IKP) in smrt. Tipična klinična slika: začetna prehodna izguba zavesti, lucidni interval (nekaj minut do nekaj ur), nato pa sledijo znaki zvišanega IKP (bruhanje, glavobol, motnje zavesti), paraliza telesa na nasprotni strani poškodbe, nezavest in smrt. Običajno je prisotna dilatirana in fiksirana zenica na strani poškodbe.
- **Akutni subduralni hematom**: krvavitev je venska, IKP počasi narašča, običajno je prisotna sočasna poškodba možganov (zato je tudi prognoza slabša).
- Poznamo **primarne poškodbe glave** (neposredna posledica poškodbe) in **sekundarne poškodbe glave** (ki so posledica edema možganov, hipoksije in/ali hipotenzije). Edem možganovine je odgovor možganov na poškodbo. Posledica je zvišan IKP, ker je volumen konstanten (edematozni možgani se zaradi lobanjskih kosti ne morejo razširiti, razen navzdol skozi foramen magnum in v zadnji fazi stisnejo možgansko deblo, kjer se nahajajo vitalno pomembni možganski centri). Povečan IKP posledično zniža perfuzijski tlak v možganih, kar povzroči ishemijo in še dodatno poveča edem možgan. Poškodovani možgani ne tolerirajo hipotenzije. Za vzdrževanje perfuzije možganov je potreben primeren sistolični krvni tlak!
- Na primarno poškodbo glave ne moremo vplivati. Lahko pa s primerno prehospitalno obravnavo poškodovanca zmanjšamo oziroma preprečimo sekundarne poškodbe glave (primerna ventilacija, oksigenacija, vzdrževanje primernega tlaka). To je tudi cilj prehospitalne obravnave.
- Pri vsaki motnji zavesti je treba nujno preveriti GLUKOZO!
- Upoštevaj tudi ostale vzroke za moteno zavest (alkohol, droge, hipotermijo ...).
- Poškodba lobanjske baze: iztekanje krvi/likvorja iz ušesa/nosu, očalni hematom, Battlejev znak.
- Očalni hematom: absolutna kontraindikacija za nazotrahealno intubacijo in nasogastrično sondo.

CUSHINGOV ODGOVOR: visok krvni tlak, bradikardija (organizem skuša zagotoviti perfuzijo možganom). Predstavlja simptomatiko zvišanega intrakranealnega pritiska (IKP).

ZENICE:

- Zenici oživčuje tretji možganski živec, ki poteka po bazi lobanje.
- Obe zenici razširjeni, nereaktivni – slaba prognoza.
- Enostransko dilatirana, reaktivna – zgodnji znak zvišanega IKP.
- Enostransko dilatirana, nereaktivna – povečan tlak na možgansko deblo.
- Ostali vzroki razširjenih zenic – poškodbe, zdravila ...

POLOŽAJ OKONČIN:

- dekortikacijski, decerebracijski položaj – znak hude poškodbe glave;
- flakcidna paraliza okončin – običajno gre za poškodbo hrbtenjače.

TEKOČINSKA TERAPIJA: Pri hudi poškodbi glave (GCS pod 9) vzdržujemo sistolični krvni tlak 110–120 mmHg (tudi če je prisotna krvavitev, ki je ne moremo kontrolirati)! Cilj je vzdrževanje cerebralnega perfuzijskega tlaka nad 60 mmHg.

KAPNOMETRIJA:

Pomen kapnometrije pri poškodbi glave – merilo ventilacije je normalna kapnografija ($ETCO_2$) 35–40 mmHg.

Profilaktična hiperventilacija ni priporočena (hiperventilacija povzroči izplavljanje CO_2, zato je v žilah nizek parcialni tlak ogljikovega dioksida (pCO_2), ki povzroči vazokonstrikcijo in zmanjša pretok krvi, posledično se zmanjša tudi cerebralna perfuzija, vpliv na zmanjšanje edema možganov pa je majhen – poškodovani možgani pa ne tolerirajo hipoperfuzije in hipoksije).

POMEMBNO

Asistirana umetna mehanska ventilacija pri hudi poškodbi glave naj bi bila 8–10/min, z dodatkom visokega % kisika. Hipoksija pomembno poveča smrtnost pri poškodbi glave.

UMETNA MEHANSKA VENTILACIJA:

Vzdrževanje kapnografije med 30–35 mmHg: umetna mehanska ventilacija 12 vpihov/min. Edina indikacija za rahlo hiperventilacijo so znaki cerebralne herniacije. Izvajamo jo šele po korekciji hipotenzije in/ali hipoksije.

Klinični znaki CEREBRALNE HERNIACIJE:

1. poškodba glave, GCS pod 9 in decerebracijski položaj.

2. poškodba glave, GCS pod 9, asimetrična ali bilateralno dilatirana, nereaktivna zenica.

3. poškodba glave, začetna GCS pod 9, hitro znižanje GCS za več kot 2 točki.

ENDOTRAHEALNA INTUBACIJA PRI POŠKODOVANCIH

Izvedemo jo, če imamo težave pri vzdrževanju proste dihalne poti ali pri vzdrževanju zadostne ventilacije in oksigenacije. Ni priporočena rutinska intubacija vseh poškodovancev, ki imajo odprto dihalno pot in primerno ventilacijo. Nekatere študije so namreč pokazale zmanjšano preživetje poškodovancev (pri poškodbah glave), če so bili intubirani na terenu na račun podaljšanega časa do prihoda do dokončne kirurške oskrbe poškodovanca in na

račun podaljšane hipoksemije med samim postopkom, zaradi aspiracije med postopkom in zaradi pozne prepoznave napačne intubacije. Intubacija je sicer zlati standard oskrbe dihalne poti (dihalna pot je odprta in hkrati zaščitena), vendar sama po sebi ne zagotavlja večjega preživetja, če ni izvedena strokovno in če zanjo porabimo preveč časa.

Nezavesten poškodovanec: čim prej je potrebno zaščititi dihalno pot z endotrahealno intubacijo.

ZAPISKI

SCENARIJ 1/06: POŠKODBA PRSNEGA KOŠA (TENZIJSKI PNEVMOTORAKS)

Klic 112: Dispečerski center zdravstva vam posreduje naslednje aktivacijsko sporočilo: *»Policija sporoča, da je v gozdu prišlo do delovne nesreče. Ena oseba je težje poškodovana.«*

Anamneza:

S: ne more dihati, bolijo ga rebra,

A: ne,

M: ima zdravila, ne ve imen,

P: pritisk, sladkorna, na dieti,

L: ne ve,

E: ne ve.

Poškodbe: tenzijski pnevmotoraks levo, zlom reber levo, pretres možganov.

OCENA KRAJA NESREČE: Mesto nesreče je varno, policija na mestu; eden poškodovanec, 50-letni moški. Mehanizem: očividci povedo, da je večja veja zadela delavca pri podiranju dreves, udarila ga je po glavi in prsnem košu.

ZAČETNI PREGLED:

- Pristop s sprednje strani k poškodovancu, varovanje vratne hrbtenice.
- **Splošni vtis**: leži na hrbtu, večjih krvavitev ni videti, splošni vtis slab (bled, cianotične ustnice, dihalna stiska), patološkega položaja okončin ni.
- **Zavest**: na glas odpre oči, stoka, nič ne ve, kaj se je zgodilo (AVPU-V).
- **A**: lahko govori le posamezne besede, dihalna pot je prosta, tujkov ni.
- **B**: pospešeno, plitvo, 50/min, cianoza ustnic, diha z velikim naporom – aplikacija 100 % kisika.
- **C**: pulz a. radialis komaj tipen, utrip 130/min, koža bleda, potna, hladna – lahko i.v. kanal (prej pregled roke).

ODLOČITEV: celotni pregled poškodovanca (glede na mehanizem in začetni pregled).

CELOTNI PREGLED POŠKODOVANCA:

1. **Glava**: buška na glavi, več udarnin in razpočnih ran, ki ne krvavijo.

2. **Vrat**: palpatorno boleč, brez vidnih poškodb; traheja pomaknjena na desno; vratne vene prekomerno polnjene – namestitev vratne opornice.

3. **Prsni koš**:

- vidna kontuzijska značka in odrgnina na prsih levo, levo se prsni koš ne dviguje, palpacija boleča na obeh straneh, levo krepitacije;
- avskultatorno levo dihanja ne slišimo, poklep levo hipersonoren;
- srčni toni slišni, pospešeni;
- ker gre za tenzijski pnevmotoraks levo, ki izpolnjuje kriterije za igelno torakocentezo, vodja tima naroči članu ekipe izvedbo posega;
- izvajalec opozori vodjo, ko je poseg opravljen;
- poškodovanec začne dihati z bistveno manjšim naporom.

4. **Trebuh**: brez vidnih poškodb, palpacija – neboleč, mehak.

5. **Medenica**: pritisk na simfizo neboleč, stis medenice neboleč in stabilen.

6. **Spodnje okončine**: obe okončini brez poškodb, motorika in senzorika prisotni.

7. **Zgornje okončine**: brez poškodb, motorika in senzorika prisotni – obračanje v osi na desni bok.

8. **Hrbet**: brez poškodb.

9. Po izvedbi igelne torakocenteze – opravimo ponovno začetno oceno.

AB: poškodovanec diha z manjšim naporom, nekoliko nižja frekvenca dihanja 40/min.

C: pulz na a. radialis bolje tipen, 115/min, cianoza se popravlja.

Vrat: traheja se nahaja na sredini, vratne vene niso prekomerno polnjene.

Prsni koš: avskultatorno levo dihanja ne slišimo, perkutatorno hipersonoren zvok, poškodovanec navaja olajšanje.

Kontrolni pregled po opravljenem posegu napravi vodja ekipe.

ODLOČITEV: »load and go« situacija. Dokončna imobilizacija na zajemalna nosila/dolgo desko.

NADALJNJA OBRAVNAVA:

VITALNI ZNAKI: KT – 110/60 mmHg, SF – 110/min, SaO_2 – 92 %, FD – 40/min.

NEVROLOŠKI: GCS 14 (E4,V4,M6), zenici enaki, normalno reagirata na svetlobo, glukoza 7,1 mmol/l.

KONTROLNI PREGLED:

- Zaradi resnosti stanja na **5 minut**.
- Ocena zavesti in ABC.
- Izvajamo kontinuirani monitoring: stanje zavesti, dihanje, oksimetrija (96 %), srčna akcija, merjenje krvnega tlaka, EKG (sinusni ritem, 90/min) in ocena bolečine.
- 2 x i.v. pot, tekočinska terapija – obstruktivni šok (infuzijska raztopina 0,9 % NaCl, Ringer).
- Analgezija: Ketamin, Piritramid in drugi analgetiki brez pomembnega vpliva na hemodinamsko stanje poškodovanca.
- Nadzor nad vstavljeno iglo za torakocentezo.
- Najava v urgentni center sprejemne bolnišnice.

Diagnoze:

- tenzijski pnevmotoraks levo,
- zlom reber levo,
- pretres možganov.

DISKUSIJA

- Tenzijski pnevmotoraks nastane, kadar lahko zrak vstopa v plevralni prostor, ne more pa iz njega izstopiti. Zrak lahko pride od zunaj (odprta poškodba prsnega koša) ali od znotraj (poškodba pljuč). Pogoj za nastanek tenzijskega pnevmotoraksa pa je, da poškodovano mesto (ali neprimerno oskrbljena poškodba) deluje kot enosmerna zaklopka (zrak spušča samo v eno smer v plevralni prostor). Posledično se z vsakim vdihom povečuje intratorakalni pritisk, ki povzroči kolaps prizadetega pljučnega krila, pomik mediastinuma v zdravo smer, pritisk na zgornjo in spodnjo veno kavo in posledično njun kolaps (zato ni venskega povratka v desno srce - nastane

obstruktivni šok s prekomerno polnjenimi vratnimi venami) in pomik traheje v zdravo smer. Tenzijskemu pnevmotoraksu je pri hudih poškodbah prsnega koša lahko pridružen še hematotoraks.

- Tenzijski pnevmotoraks nastane hitro (z vsakim vdihom je tlak v prsni votlini višji).
- Premik traheje je pozen znak in jo redko vidimo na terenu.
- **Igelna dekompresija**: Ko ima poškodovanec klinične znake tenzijskega pnevmotoraksa in sta prisotna vsaj dva od treh kriterijev (**huda dihalna stiska s cianozo, šok z netipnim radialnim pulzom, motnja zavesti**), je treba na terenu takoj napraviti igelno torakocentezo. Iglo širokega premera vstavimo v drugi medrebrni prostor v srednji ključnični liniji tik nad zgornjih robom tretjega rebra na prizadeti strani prsnega koša. Ob uspešni dekompresiji je slišen šum izhajajočega zraka, klinično stanje poškodovanca pa se hitro izboljša. S tem posegom namreč tenzijski pnevmotoraks spremenimo v odprtega z ventilom, ki je za poškodovanca manj nevaren.
- Način izvedbe posega: Na strani prsnega koša, na kateri je pnevmotoraks, spredaj v medioklavikularni liniji določimo 2. interkostalni prostor. To lahko naredimo tudi tako, da tipamo »Luisov kot« (izboklina na prsnici, ki se nahaja na eni četrtini oddaljenosti med jugulumom in ksifoidom). Sprednji pristop je priporočljiv zato, ker se pri poškodovancu, ki leži na hrbtu, zrak nabere zgoraj (in ne v srednjem aksilarnem področju). Tudi nadzor nad mestom dekompresije je lažji (manjša verjetnost, da se igla nehote premakne). Če pa je sprednja stran huje poškodovana, lahko dekompresijo naredimo tudi v srednji aksilarni liniji v 4. ali 5. medrebrnem prostoru tik nad 5. ali 6. rebrom (orientacijsko: prsna bradavica se nahaja nad 5. rebrom).
- Nenadoma zmanjšana pljučna komplianca pri intubiranem pacientu: Bodimo pozorni na tenzijski pnevmotoraks (večja nevarnost pri astmatikih, KOPB, ker pozitivni tlaki, s katerimi ventiliramo poškodovanca, hitreje poškodujejo bolna pljuča kot pa zdrava).
  Spontano dihanje: V plevralnem prostoru je negativen tlak, dihalno delo razširi prsni koš, negativen tlak v plevralni votlini pa povzroči, da pljuča sledijo steni prsnega koša.

  Umetna ventilacija: Pozitivni tlaki v dihalnih poteh razprejo pljuča in ti pozitivni tlaki lahko poškodujejo pljuča ali ob nerazrešenem tenzijskem pnevmotoraksu poslabšajo že tako zahtevno stanje.

ZAPISKI

SCENARIJ 1/07: AMPUTACIJA NOGE NAD KOLENOM (HEMORAGIČNI ŠOK)

Klic 112: Dispečerski center zdravstva je poslal naslednje sporočilo: *»Nesreča na železniških tirih, osebo povozil vlak, policija aktivirana.«*

Anamneza:

S: stoka od bolečin,

A: ne,

M: ne,

P: ne,

L: nič,

E: ne ve.

Poškodbe: amputacija desne spodnje okončine tik nad kolenom, odprti zlom leve goleni, hemoragični šok.

OCENA KRAJA NESREČE: Varno, vlak ustavljen; samo eden poškodovanec, starejši moški; mehanizem: strojevodja vlaka pove, da je s perona padel pred vlak.

ZAČETNI PREGLED:

- Pristop s sprednje strani k poškodovancu, takoj ob prvem stiku začnemo z varovanjem vratne hrbtenice.
- **Splošni vtis**: poškodovanec leži na hrbtu, popolna amputacija desne noge tik nad kolenom, arterijska krvavitev iz desnega krna, veliko krvi okrog njega – takojšnja oskrba arterijske krvavitve z Esmarchovo zažemo **(C)**.
- **C**: pulz a. radialis netipen, pulz a. karotis slabo tipen, fr. 140/min, koža bleda, pepelnata, potna, hladna – lahko i.v. kanal (prej pregled roke).
- **Zavest**: na klic se odzove (AVPU-V).
- **A**: težko govori, grgranje – aspiracija zgornjih dihal (kri v ustni votlini), po aspiraciji prosta dihalna pot.
- **B**: plitvo, 20/min – aplikacija 100 % kisika.

ODLOČITEV: izvedba celotnega pregleda (glede na mehanizem in začetni pregled).

CELOTNI PREGLED POŠKODOVANCA:

1. **Glava**: odrgnine in udarnine po glavi, ni krvavitve.
2. **Vrat**: brez vidnih ali tipnih poškodb; traheja na sredini; vratne vene prazne – namestitev vratne opornice.
3. **Prsni koš**: normalno gibanje prsnega koša ob dihanju, brez vidnih poškodb, palpacija neboleča, ni krepitacij, avskultatorno dihanje normalno slišno na obeh straneh, srčni toni slišni, pospešeni.
4. **Trebuh**: brez vidnih poškodb, trebuh na dotik mehak in neboleč.
5. **Medenica**: pritisk na simfizo neboleč, stis pelvisa neboleč in stabilen.
6. **Spodnje okončine**: amputirana desna spodnja okončina tik nad kolenom, krvavitev je že ustavljena – oskrba krna; leva stegnenica ni videti poškodovana, leva golen - prisotna krvavitev, krepitacije (odprti zlom) – tretji član ekipe razreže hlače, sezuje čevelj in pogleda okončino: močno deformirana, sterilna oskrba odprtega zloma.
7. **Zgornje okončine**: brez poškodb, motorika in senzorika prisotni – obračanje v osi na levi bok.
8. **Hrbet**: brez poškodb.

ODLOČITEV: »load and go« situacija. Dokončna imobilizacija na zajemalna nosila/dolgo desko. Oskrba amputiranega dela okončine.

NADALJNJA OBRAVNAVA:

VITALNI ZNAKI: KT – nemerljiv, SF – 140/min, SaO_2 – 89 %, FD – 20/min.

NEVROLOŠKI PREGLED: GCS 13 (E4, V4, M5), zenici enako široki, na svetlobo reagirata normalno, glukoza 7,1 mmol/l.

KONTROLNI PREGLED:

- Zaradi resnosti stanja na **5 minut**.
- Ocena zavesti in ABC.
- Izvajati kontinuirani monitoring: stanje zavesti, dihanje, oksimetrija, srčna akcija, merjenje krvnega tlaka, EKG in ocena bolečine.
- 2 x i.v. pot, tekočinska terapija (0,9 % NaCl, Ringer) – vzdrževanje permisivne hipotenzije (glede na hud mehanizem nesreče, kjer ne moremo izključiti morebitne notranje krvavitve, ki je ne moremo ustaviti, pa je ob pregledu še skrita).
- Analgezija: dormicum + ketanest.
- Aplikacija traneksaminske kisline (TXA) v odmerku 1000 mg (1g) v 100 ml 0,9 % NaCl i.v./10 min.
- Najava v urgentni center sprejemne bolnišnice.

Diagnoze:

1. travmatska amputacija desne noge nad kolenom,
2. odprti zlom leve goleni,
3. hemoragični šok.

DISKUSIJA

1. Oskrba hude arterijske krvavitve mora biti takojšnja, **zato se zaporedje ABC spremeni v CAB.** Vodja ekipe začne inicialni pregled s C, potem pa sledita A in B.
2. **C**: če je pacient **pri zavesti**, tipamo pulz arterije radialis, pri **nezavestnem** pa istočasno na a. radialis in a. karotis (s tem pridobimo na času).
3. **Načini ustavljanja hudih krvavitev**: neposredni pritisk na rano, kompresijska preveza, Esmarchova zažema, hemostatične snovi.
4. Hemostatične snovi (QuikClot, Celox): Priporočila so sledeča, če gre za zelo hudo krvavitev, ki je ne moremo ustaviti niti z Esmarchovo zažemo (na primer dimlje, aksila), zatlačimo hemostatično snov v rano in tiščimo (NE v odprte rane prsnega koša in trebuha!).
5. **Oskrba amputiranega uda**: vlažno sterilno pokrijemo, primerna preveza.
6. **Oskrba manjših amputiranih delov uda – npr. prstov**: amputiran del je potrebno zaviti v sterilno gazo, navlaženo z Ringerjevo raztopino, svitek položimo v čisto plastično vrečko, v drugo vrečko damo raztopino ledu in vode; obe vrečki položimo eno ob drugo, da s tem hladimo amputiran del – temperatura 4 do 6 stopinj C); nikoli ne **uporabljamo različne hladilne bloke ali dajemo amputirane dele neposredno na led.**
7. **Kompartment sindrom**: mišice so v zaprtih prostorih, ki jih obdajajo močne fascije. Če pride znotraj teh prostorov do krvavitve, edema … (kot posledica poškodbe – npr. zlom golenice), znotraj naraste tlak, ki najprej stisne vene, živce, na koncu pa še arterije in prekine se pretok krvi v distalna tkiva. Najpogosteje nastane na podlakti in goleni. Prva znaka sta bolečina in parestezije (običajno se razvije v nekaj urah). **Pozni simptomi kompartment sindroma (5P): bolečina, bledica, odsoten periferni utrip, parastezija, paraliza (ang. p**ain, **p**allor, **p**ulselessness, **p**aresthesia, **p**aralysis).

HEMORAGIČNI ŠOK:

Krvavitev, ki jo lahko kontroliramo (večina poškodb ekstremitet): dajemo boluse tekočin 20 ml/kg, pri otrocih 10 ml/kg in kontroliramo stanje. Krvni tlak lahko dvigujemo do normale (120 mmHg).

Krvavitev, ki je ne moremo kontrolirati (notranje krvavitve): vzdržujemo permisivno hipotenzijo (vzdrževanje zadostne periferne perfuzije – sistolični tlak do tipnih perifernih pulzov). S prekomerno tekočinsko obremenitvijo dvignemo krvni tlak (in s tem povečamo krvavitev), hkrati pa povzročimo tudi razredčenje koagulacijskih faktorjev.

Huda poškodba glave s pridruženim hemoragičnim šokom: vzdržujemo normalen krvni tlak vsaj 120 mmHg (poškodovani možgani namreč ne tolerirajo hipotenzije).

ZAPISKI

PRISTOP IN OSKRBA KRITIČNO BOLNEGA ODRASLEGA PACIENTA

Učni cilji

Po zaključku scenarija bo udeleženec zmožen:

- ☐ razdeliti ključne vloge v timu in uporabiti jasno timsko komunikacijo;
- ☐ prepoznati klinično sliko in stopnjo ogroženosti pacienta;
- ☐ izvesti oceno stanja pacienta, pri tem uporabiti strukturiran pristop ABCDE in povezati vitalne znake, anamnezo in prepoznano simptomatiko;
- ☐ določiti prednostno zaporedje ukrepov ter izvesti postopke in posege v okviru kompetenc ali po naročilu zdravnika;
- ☐ zagotoviti kontinuiran monitoring, najavo sprejemni ustanovi in strukturirano predajo pacienta.

Strokovna priporočila in smernice

Scenariji se nanašajo na priporočila Evropskega reanimacijskega sveta za odrasle ALS 2025 (ang. Adult Advanced Life Support).

Splošna vprašanja ob koncu vsakega scenarija


- Kateri podatki so vas najprej usmerili k pravilni prepoznavi kliničnega problema v scenariju?
- Kateri ukrep je bil v prvih minutah časovno najbolj kritičen in zakaj ste ga izvedli v izbranem zaporedju?
- Kje v tem scenariju bi lahko nastala najpomembnejša varnostna napaka in kako bi jo preprečili?
- Kako je potekala razdelitev vlog, komunikacija znotraj tima in predaja informacij ter kaj bi ob ponovitvi scenarija izvedli drugače?

SCENARIJ 2/01: AKUTNI KORONARNI SINDROM Z ELEVACIJO SPOJNICE ST (STEMI)

Klic 112: *»45-letni pacient ima bolečino v prsnem košu s širjenjem v žličko in vrat, bolečino čuti zadnji 2 uri. Bolečina je stiskajoča in se stopnjuje, zadnjo uro tudi težje pride do sape. Bruhal 2-krat.«*


Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
A – prosta.			
B: FD – 18/min, slišni zastojni poki obojestransko, piski in krepitacije bazalno, SaO_2 – 85 %.	Avskultacija, SaO_2 na prst.	Kisik: 12–15 l/min, ustrezna maska, sedeč položaj.	
C: KT – 110/60 mmHg, SF – slišen reden ritem 105/min, koža hladna potna.	Tipanje pulza radialno, merjenje KT, avskultacija srčnih tonov, snemanje EKG (STEMI – sp. stene + desni odvodi), monitoring.	Prosta i.v. pot Furosemid (Lasix, Edemid) – 40 mg i.v. Morfij (2 + 2 + 2) ml i.v. Tietilperazin (Torecan) 1 amp. i.v. ASA (Aspirin) 300 mg p.o./ (Aspegic 300 mg i.v.).	Če aplikacija glicerintrinitrata (nitroglicerin), potem nastopi motnja srčnega ritma (VF). Če ni terapije nastopi dihalna stiska – nezavest – VF.
D: pogovorljiv, bolečinsko prizadet VAS 8/10, glukoza – 5,0 mmol/l GCS – 15.			
E – cianotične ustnice, poten, hladne okončine.	Vidni znaki dihalne stiske in prizadete cirkulacije – kardiogeni šok.		
	ODLOČITEV ZA KATETRSKI LABORATORIJ – PTCA.		
		Heparin 5000 i.e i.v. Tikagrelor (Brilique) (180 mg = 2 tbl) p.o. ali Prasugrel (Effient) (60 mg = 6 tbl) p.o.	
Ponovna ocena ABCDE	**Poslabšanje stanja kljub ukrepom**		
A – prosta.			
B – poglabljanje dihalne stiske.		SaO_2 – 80 %, razmisli o CPAP; razmisli o ETI.	
C: SF – 85 /min, KT – 80/50 mmHg, tihi toni.		Vazoaktivna zdravila: Noradrenalin 0,025–1 µg/kg/min, i.v. Suprarenin (adrenalin): 2–10 mcg/min i.v.	Izguba zavesti, VT/VF, reanimacija.

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
DISKUSIJA	**Ukrepi ob odpovedi srca kot črpalke, znaki srčnega popuščanja, kardiogeni šok.**		



Slika 1: EKG zapis - akutni miokardni infarkt spodnje stene

Vir: https://litfl.com/inferior-stemi-ecg-library/



Slika 2: EKG zapis – EKG posnetek desnih prekordialnih odvodov

Vir: https://litfl.com/inferior-stemi-ecg-library/

DISKUSIJA

Srčno popuščanje je stanje, pri katerem pride do motenj v delovanju srca zaradi oslabljenega polnjenja (diastolična disfunkcija) ali zmanjšane sposobnosti iztisne funkcije (sistolična disfunkcija). To vodi do zastoja tekočin v pljučih in perifernih tkivih in/ali posledične hipoperfuzije organov.

Delitev srčnega popuščanja

1. **Sistolično srčno popuščanje:** Značilno zmanjšan iztisni delež levega prekata (EF < 40 %).
2. **Diastolično srčno popuščanje:** Normalen ali skoraj normalen iztisni delež (EF ≥ 50 %), vendar z zmanjšano sposobnostjo relaksacije in polnjenja.
3. **Levosrčno popuščanje:** Pretežno zastoj v pljučnem obtoku (dispneja, ortopneja).
4. **Desnosrčno popuščanje:** Pretežno zastoj v sistemskem obtoku (edemi, hepatomegalija, ascites).

Kardiogeni šok je življenjsko nevarno stanje, ki se pojavi zaradi hude okvare srčne funkcije, kar vodi do nezadostnega minutnega volumna srca in posledične hipoperfuzije tkiv in organov. Gre za urgentno stanje, ki zahteva hitro in agresivno zdravljenje, saj takšno stanje brez ustreznih ukrepov vodi v visoko smrtnost. Kardiogeni šok je opredeljen kot stanje, kjer je srce nezmožno učinkovito črpati kri, kar povzroči:

1. zmanjšano dostavo kisika tkivom,
2. presnovno laktatno acidozo (zaradi anaerobne presnove),
3. multi-organsko odpoved.

Ključen patofiziološki mehanizem je **kritično zmanjšan srčni iztis** zaradi primarne okvare miokarda, ventrikularne funkcije ali srčnih zaklopk. To vodi v začarani krog hipoperfuzije in ishemije, ki še poslabša osnovno srčno disfunkcijo.

Zdravljenje kardiogenega šoka je usmerjeno v obnovo perfuzije, izboljšanje srčne funkcije in obvladovanje osnovnega vzroka. Vključuje naslednje korake:

1. **Zdravila za hemodinamično podporo:**

- **Vazopresorji:** Suprarenin (Adrenalin), Noradrenalin in Vazopresin za zvišanje sistemskega žilnega upora in krvnega tlaka. Za teren sta primerna Suprarenin in Noradrenalin.
- **Inotropi:** Dopamin, Dobutamin, Levosimendan in Suprarenin (adrenalin) za povečanje kontraktilnosti srca. Za teren je primeren Suprarenin.
- **Diuretiki:** Za zmanjšanje volumske preobremenitve (previdna uporaba).

2. **Reperfuzijska terapija (pri ishemični etiologiji):**

- Primarna perkutana koronarna intervencija (PCI).

3. **Mehanska podpora cirkulacije:**

- Intraaortna balonska črpalka (IABP) za zmanjšanje obremenitve in izboljšanje iztisa srca.
- Naprave za mehansko podporo levega prekata (Impella, ECMO) pri refraktarnem šoku.


4. **Specifična kardio-kirurška obravnava osnovnega vzroka.**

SCENARIJ 2/02: ANAFILAKTIČNI ŠOK

Klic 112: *»Mož pelje v ambulanto NMP 32 let staro gospo, ki jo je pičilo več čebel. Gospa je alergična na več stvari, je prizadeta, težko diha in ne more povezano govoriti.«*

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
A – hripav glas, stridor.	Ocena dihalne poti.		
B: FD – 36/min, uporaba pomožnih mišic, slišen inspiratorni stridor, bronhospazem SaO_2 – 85 %.	Avskultacija, SaO_2 na prst.	Kisik: 12–15 l/min, ustrezna maska, vodoravni položaj, razmisli o ETI.	Vse težje diha, saturacija pada, pojav zmedenosti.
C: KT – 90/45 mmHg, SF – 130/min, slišen reden ritem 130/min, kapilarna polnitev – 3 s.	Tipanje pulza radialno, merjenje KT, avskultacija srčnih tonov, EKG Monitoring.	Vodoravni položaj, i.v. pot – 2 x 0,9 % NaCl – do 1000 ml, Adrenalin 0,5 mg, i.m. Klemastin (Tavegyl) – 2 mg, i.v. Solucortef – 200 mg i.v.	Zastoj dihanja, izguba zavesti, nemerljiv tlak.
D: ne more govoriti, prestrašena, glukoza – 6,0 mmol/l, GCS - 15			
E – utrikarija in eritem kože.	Vidni znaki dihalne stiske in prizadete cirkulacije – kardiogeni šok.	Odstrani antigen.	
Ponovna ocena ABCDE	**Izboljšanje stanja**		
A – stridor popusti, še nekoliko hripava.	Ocena dihalne poti.		
C: SF – 100 /min, KT – 110/70 mmHg, EKG – sinusni ritem.	Merjenje KT, poslušanje srca, snemanje EKG.	Nadzor aplikacije infuzij.	Izguba zavesti, VTp/VF, reanimacija.
D: nevrološko brez posebnosti.			
E: eritem popušča, utrikarija ostaja.			
	Poslabšanje stanja		

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
A: oteklina jezika, laringealni edem.	Ocena dihalne poti.	Ventilacija z dihalnim balonom ni učinkovita. Pristop k RSI in ETI: - analgezija, sedacija, relaksacija, - konikotomija - umetna ventilacija: Vt = 6–8 ml/kg.	Bradiaritmija, Asistilija.
C: KT – nemerljiv, SF – na a. carotis 130/min – 40/min, EKG – iz tahikardije v bradikardijo, kapilarna polnitev – 5 s.	Tipanje pulza, merjenje KT, poslušanje srca, snemanje EKG.	Vazoaktivna zdravila: **Adrenalin**: 20–50 mcg bolus i.v. Če jemlje beta-blokerje: **Glukagon** 1 mg i.v. Algoritem REA (bradiaritmija).	
DISKUSIJA	**Kdaj intubirati?** **Priprava na RSI.** **Kirurška oskrba dihalne poti (konikotomija).**	**Midazolam (Dormicum):** 0,1–0,3 mg/kg (5 ml = 5mg), **Ketamin (KetanestS):** 0,5–1 mg/kg (1 amp. = 50 mg/2 ml), **Etomidate**: 0,2–0,3 mg/kg i.v. (1 amp. = 20 mg), **Fentanyl**: 2–3 mcg/kg i.v. (pazi nizek tlak); 1 amp. = 100 mcg/2 ml), **Piritramid**: 0,2 mg/kg i.v. (1 amp. = 2 ml = 15 mg), **Thiopental**: 3–5 mg/kg i.v. (1 amp. = 500 mg ali 1000 mg).	**Relaksanti:** **Sukcinilholin:** 1–1,5 mg/kg i.v. (1 amp. = 5 ml = 100 mg, **Rokuronijev bromid (Esmeron)**: 0,6–1 mg/kg i.v. (1 amp. = 50 mg/5 ml).



Slika 2: EKG zapis – sinusna tahikardija

Vir: https://litfl.com/wp-content/uploads/2018/08/ECG-Sinus-tachycardia-1.jpg

DISKUSIJA

Konikotomija (ali krikotirotomija) je medicinski postopek, ki se izvaja v nujnih primerih za zagotovitev prehodnosti dihalne poti. Gre za ustvarjanje odprtine v sapniku skozi **krikotiroidno membrano**, ki se nahaja med ščitničnim (tiroidnim) in krikoidnim hrustancem v vratu.

Indikacije za konikotomijo

Postopek je potreben, ko so zgornje dihalne poti popolnoma zaprte in ni mogoče izvesti intubacije skozi usta ali nos (npr. zaradi oteklin, poškodb, tujka ali **anafilaksije**).

Priprava:

- **Prepoznavanje anatomskih struktur**: S prsti tipamo sprednjo stran vratu, da identificiramo ščitnični hrustanec («Adamovo jabolko») in krikoidni hrustanec. Krikotiroidna membrana se nahaja med njima. Uporabimo aseptično metodo.

Potek postopka:

1. **Položaj pacienta**: Glava je, če je mogoče, rahlo iztegnjena, da se olajša dostop do vratu.
2. **Lokalizacija membrane**: Krikotiroidno membrano jasno opredelimo s palpacijo.
3. **Rez**:

- S sterilnim skalpelom naredimo prečni rez skozi kožo nad krikotiroidno membrano.
- Nato prerežemo krikotiroidno membrano, da ustvarimo odprtino.

4. **Vstavitev kanile ali cevke**: V odprtino vstavimo kanilo ali endotrahealno cevko, da zagotovimo prehod zraka v sapnik.
5. **Zagotavljanje dihanja**: Na zgornji nastavek tubusa namestimo ročni dihalni balon ali ventilator.

6. **Tveganja in zapleti:**

- poškodbe okoliških struktur, kot so krvne žile ali žrelo;
- okužba;
- dolgotrajne poškodbe grla ali sapnika;
- nezadostno lajšanje obstrukcije, če je postopek izveden nepravilno.

Nadaljnje ukrepanje:

Konikotomija je začasna rešitev. Dokončna oskrba dihalne poti se izvede v bolnišnici. To je zelo invaziven postopek, ki ga smejo izvajati le ustrezno usposobljeni zdravstveni delavci.


ZAPISKI

SCENARIJ 2/03: HEMODINAMSKO POMEMBNA BRADIKARDIJA

Klic 112: *»60-letni pacient ima že več let hipertenzijo, danes je ves dan omotičen, ima težjo sapo, 1-krat je za kratek čas izgubil zavest.«*

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
A – prosta.	Ocena dihalne poti.		
B: FD –18/min, blaga dispeja, avskultatorno normalno slišno dihanje, SaO_2 – 97 %.	Avskultacija, SaO_2 na prst.		
C: KT – 90/60 mmHg, SF – 35/min, slišen reden ritem 35/min, EKG – AV blok 3. stopnje.	Tipanje pulza radialno, merjenje KT, EKG monitoring.	Vodoravni položaj. i.v. pot – 2 x. Atropin do 3 mg (3–5 min), priprava in izvedba zunanje elektrostimulacije (analgezija, sedacija).	SF – 25/min, KT – 70/(?), motnje zavesti.
D: GCS 15, zenici enako široki, simetrični, reaktivni, glukoza – 5,0 mmol/l, GCS – 15.			
E – afebrilen.			
Ponovna ocena ABCDE	**Izboljšanje stanja**		
A – prosta.			
B – 16/min, SaO_2 – 99 %.	Avskultacija, SaO_2.		
C: SF – 80/min, KT – 130/90 mmHg.	Merjenje KT, poslušanje srca, snemanje EKG.		Motnja zavesti, cirkulatorna odpoved, bradiaritmija – PEA.
D: nevrološko brez posebnosti.			
E: afebrilna.			
	Poslabšanje stanja		
A:	Ocena dihalne poti.		
B: SaO2 – 89 %.		Kisik 10–15 l/min	

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
C: KT – 70/0 mmHg, SF – 35/min, EKG – AV blok III. st.	Tipanje pulza, merjenje KT, poslušanje srca, snemanje EKG.	Izvedba zunanje elektrostimulacije.	Asistolija s posameznimi QRS kompleksi.
Ponovna ocena ABC			
B: FD – 18/min, SaO2 – 99 %.			
C: SF – 70/min, KT – 120/65 mmHg.	KT, EKG.		
DISKUSIJA	**Kako pripraviti pacienta in izvesti zunanjo elektrostimulacijo?** - **Frekvenca utripa,** - **električni tok za stimulacijo,** - **ocena učinkovitosti stimulacije (električni in mehanski odziv),** - **položaj elektrod.**	**Midazolam (Dormicum):** 0,1–0,3 mg/kg i.v. (5 ml = 5mg), **Ketamin (KetanestS):** 0,5–1 mg/kg i.v. (1 amp. = 50 mg/2 ml), **Etomidate**: 0,2–0,3 mg/kg i.v. (1 amp. = 20 mg), **Fentanyl**: 2–3 mcg/kg i.v. (pazi nizek tlak) 1 amp. = 100 mcg/2 ml), **Piritramid**: 0,2 mg/kg i.v. (1 amp. = 2 ml = 15 mg), **Thiopental**: 3–5 mg/kg i.v. (1 amp. = 500 mg ali 1000 mg), **Morfij**: 2 mg i.v.	**Relaksanti:** **Sukcinilholin**: 1–1,5 mg/kg i.v. (1 amp. = 5 ml = 100 mg, **Rokuronijev bromid (Esmeron)**: 0,6–1 mg/kg i.v. 1 amp. = 50 mg/5 ml).
Znaki resne prizadetosti	**F: < 40/min,** **RR: < 90 mmHg,** **znaki srčnega popuščanja,** **bolečina v prsnem košu.**	**Nevarnost asistolije:** **asistolna pavza > 3 s,** **AV blok 2. stopnje, Mobitz II.,** **AV blok 3. st.**	



Slika 3: EKG zapis – AV blok 3. stopnje

Vir: https://litfl.com/wp-content/uploads/2018/08/ECG-Complete-heart-block-CHB-2.jpg



Slika 4: EKG 2 – posnetek EKG po elektrostimulaciji

Vir: https://litfl.com/wp-content/uploads/2018/08/AV-sequential-pacing-3-2.jpg

Postopek izvedbe zunanje elektrostimulacije

Priprava na postopek

1. Priprava opreme:

– monitor/defibrilator z zmogljivostjo elektrostimulacije,

- samolepilne elektrode za stimulacijo,
- vir kisika, če je potreben,
- oprema za spremljanje pacientovega EKG-ja in življenjskih funkcij,
- analgetiki ali sedativi.

2. Priprava pacienta:

- pacienta pomirimo in pojasnimo postopek,
- preverimo in očistimo kožo na mestu pritrditve elektrod (običajno anteriorno-posteriorni položaj ali anterolateralni položaj).

Izvedba postopka

1. Nalepimo ekstremitetne EKG elektrode in terapevtske stimulacijske elektrode.
2. Priključitev na defibrilator/monitor: elektrode povežemo s stimulatorjem in preverimo delovanje sistema.
3. Analgezija in sedacija: elektrostimulacija je boleča, zato se pri zavestnih pacientih lahko uporabijo analgetiki ali sedativi (npr. midazolam, etomidate in fentanil).
4. Nastavitev parametrov:

- Preklopimo napravo na način elektrostimulacije (angl. „Pacer mode“).
- Frekvenca (ang. rate): nastavimo ciljno frekvenco (običajno 60–80 utripov/min).
- Tok stimulacije (ang. current): začnimo z nizkimi tokovi (npr. 40 mA) in jih postopno zvišujmo, dokler ne dosežemo ventrikularnega odziva. To pomeni, da vsaka električna stimulacija povzroči kontrakcijo srca (vidno kot širok QRS kompleks na EKG-ju).
- Spremljajmo EKG in pulz, da potrdimo mehansko in električno odzivnost srca. Ko dosežemo mehansko aktivnost srca, povečamo jakost toka stimulacije zaradi stabilnosti za 10 mA.

5. Spremljanje pacienta:

- Spremljamo vitalne funkcije, saturacijo s kisikom in odziv na zdravljenje.
- Zagotavljamo ustrezno oskrbo z dodatnim kisikom, če je potrebno.


ZAPISKI

SCENARIJ 2/04: MOŽGANSKA KAP (HEMORAGIČNA OBLIKA)

Klic 112: *»71-letna gospa ima pol ure trajajoč glavobol, zdravi se zaradi povišanega tlaka in atrijske fibrilacije (AF) na Xarelti 20 mg, 1-krat je bruhala, je zaspana, ne more hoditi in težko govori.«*

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
A – prosta.	Ocena dihalne poti.		
B: FD – 20/min, blaga dispeja, avskultatorno normalno slišno dihanje, SaO_2 – 91 %.	Avskultacija, SaO_2 na prst.	Kisik do ciljne vrednosti 94–98 %.	
C: KT – 240/130 mmHg, SF – 110–130/min, slišen nereden tahikarden ritem, EKG – AF (110–130).	Tipanje pulza radialno, merjenje KT, EKG monitoring, 12-kanalni EKG.	Položaj s podloženo glavo, i.v. pot, Kaptopril 25 mg p.o., Gliceriltrinitrat (NTG): 1–2 vpiha s.l., Urapidil (Ebrantil) 25 mg počasi i.v.	Motnja zavesti s krči.
D: nepovezan govor, leva zenica nekoliko širša, desnostranska hemipareza, glukoza – 8,0 mmol/l, GCS – 11.	Merjenje glukoze, ocena zenic.	Priprava na transport, TXA – po konzultaciji z nevrologom.	Dihalni zastoj.
E – afebrilen			
Ponovna ocena ABCDE	**Poslabšanje stanja**		
A – smrči.			
B: FD – 12/min, SaO_2 – 90 %.	Avskultacija, SaO_2.	Kisik, oskrba dihalne poti – RSI (Tiopental), umetna ventilacija, Vt = 6–8 ml/kg .	Dihalni zastoj.
C: SF 110–130/min, KT – 180/100 mmHg.	Merjenje KT, EKG.		PEA
D: GCS – 3, leva zenica širša.			
E: afebrilna.			

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
DISKUSIJA (Priprava zdravil po zdravnikovem naročilu.)	- **Znaki ishemične in hemoragičnega ICV,** - **antikonvulzivna terapija,** - **Lorazepam 4 mg (1 amp.) i.v.,** - **Midazolam 2 mg i.v.,** - **Apaurin (10 mg) i.v.,** - **Midazolam (Epistatus) 10 mg bukalno,** - **Levetiracetam (Keppra) i.v. 1000 mg = 2 amp. v 100 ml 0,9 % NaCl ali glukozo 5 %.**	**Midazolam:** 0,1–0,3 mg/kg (5 ml = 5 mg) i.v., **Ketamin (KetanestS):** 0,5–1 mg/kg (1 amp. = 50 mg/2 ml) i.v., **Etomidate**: 0,2–0,3 mg/kg (1 amp. = 20 mg): 2–3 mcg/kg i.v. (pazi nizek KT), **Fentanyl** 1 amp. = 100 mcg/2 ml) i.v., **Piritramid**: 0,2 mg/kg (1 amp. = 2 ml = 15 mg) i.v., **Thiopental**: 3–5 mg/kg (1 amp. = 500 mg ali 1000 mg) i.v., **Morfij**: 2 mg.	**Relaksanti:** **Sukcinilholin** 1–1,5 mg/kg (1 amp. = 5 ml = 100 mg i.v., **Rokuronijev bromid (Esmeron)**: 0,6 –1 mg/kg (1 amp. = 50 mg/5 ml) i.v.



Slika 5: EKG zapis – atrijska fibrilacija

Vir: https://litfl.com/wp-content/uploads/2018/08/ECG-Atrial-Fibrillation-coarse-flutter-waves.jpg

ZAPISKI

SCENARIJ 2/05: VZPOSTAVITEV PROSTE DIHALNE POTI S HITRIM ZAPOREDJEM UKREPOV (RSI)

Klic 112: »*Očividci so našli obešenca in mu hitro prerezali vrv, še diha in krvavi iz glave. Gospod, star 60 let, gre za poskus samomora z obešenjem. Ob rezanju vrvi je gospod padel in z glavo udaril ob okensko polico.«*

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
A – hropenje.	Ocena dihalne poti.	Varovanje vratne hrbtenice in trojni manever.	
B: FD – 24/min, slišno obojestransko normalno slišno dihanje, SaO_2 – 86 %, $EtCO_2$ – 50 mmHg.	Avskultacija, SaO_2 na prst.	Kisik, oskrba dihalne poti – RSI. Parametri ventilator: (FD – 12/min, Vt = 6–8 ml/kg, tlak: 35 mmHg).	Padec SpO_2, agonalno dihanje.
C: SF – 110/min, KT – 160/100 mmHg, rana v zatilnem predelu glave.	Tipanje pulza radialno/karotidno, merjenje KT, EKG monitoring.	i.v. pot, NaCl 0,9 %, oskrba rane.	
ITLS pregled	Generaliziran mehanizem.	Vratna opornica.	
D: GCS 6 (oči – 1, govor – 2, motorika – 3), zenici enako široki, simetrični, reaktivni, glukoza – 10,0 mmol/l.			
E – afebrilen.			
Izvedba RSI			
Priprava	Priprava opreme: laringoskop, tubus, vodilo, dihalni balon, monitoring.		
Preoksigenacija	100 % kisik – 5 minut.		
Predoskrba	**Analgetik**: Fentanyl, Piritramid.		
Paraliza z indukcijo	**Sedacija:** Midazolam, Etomidat, Ketamin, Tiopental. **Relaksacija:** Sukcinilholin, Rocuronijev bromid (Esmeron).		
Položaj za intubacijo	Selikov manever, varovanje vratne hrbtenice.		
Intubacija	Pravi tubus, preveri lego in globino, popusti Sellickov manever.		

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
Po intubacijska oskrba	Pritrditev tubusa, polnjenje balončka. $EtCO_2$ (35–45 mmHg), poslušanje pljuč in umetna ventilacija, monitoring (KT, SaO_2 $ETCO_2$, EKG).		
Ventilacija	Preklop na ventilator: frekvenca 12/min, Vt – 500 ml, tlak 35 mmHg.		
Ponovna ocena ABCDE			
DISKUSIJA (Priprava zdravil po zdravnikovem naročilu.)	**Zdravila za RSI in odmerki.**	**Midazolam (Dormicum):** 0,1–0,3 mg/kg i.v.(5 ml = 5mg), **Ketamin (KetanestS): 0**,5–1 mg/kg i.v.(1 amp. = 50 mg/2 ml), **Etomidate**: 0,2–0,3 mg/kg i.v. (1 amp. = 20 mg), **Fentanyl**: 2–3 mcg/kg i.v. (pazi nizek KT) 1 amp. = 100 mcg/2 ml), **Piritramid**: 0,2 mg/kg i.v. (1 amp. =2 ml = 15 mg), **Thiopental**: 3–5 mg/kg i.v. (1 amp. = 500 mg ali 1000 mg) **Morfij**: 2 mg i.v.	**Relaksanti:** **Sukcinilholin** 1–1,5 mg/kg i.v. (1 amp. = 5 ml = 100mg, **Rokuronijev bromid (Esmeron**: 0,–1 mg/kg i.v. (1 amp. = 50 mg/5 ml).

Intubacija s hitrim zaporedjem postopkov (RSI) je postopek, ki se uporablja za hitro in varno vzpostavitev dihalne poti z endotrahealno cevjo. Namen je preprečiti aspiracijo želodčne vsebine, zmanjšati tveganje za hipoksijo in hitro vzpostaviti nadzor nad dihanjem pri pacientih, ki potrebujejo zaščito dihalnih poti ali mehansko ventilacijo.

Ključni elementi RSI so:

1. **Predoksigenacija**

– Pacienta se pred intubacijo preoksigenira z visoko koncentracijo kisika (100 %) za 3–5 minut, da se poveča zaloga kisika v pljučih in zmanjša tveganje za desaturacijo.

2. **Priprava na postopek (7 P)**

– Priprava opreme (laringoskop, endotrahealna cev, sesalni kateter);
– pozicioniranje pacienta (optimalna lega vratu in glave za intubacijo);
– premedikacija, če je potrebna (npr. lidokain za zmanjšanje refleksa);
– paralik (uporaba mišičnih relaksantov);
– postopek intubacije;
– preverjanje lege cevke (avskultacija pljuč in kapnografija);
– postintubacijska oskrba (fiksacija cevke, nastavitev ventilatorja).

3. **Uporaba zdravil**

- **Analgezija:** Ketamin, fentanyl, piritramid odvzamejo pacientu bolečino.
- **Sedacija:** Hitrodelujoči sedativi, kot so etomidat, ketamin, tiopental, midazolam ali propofol pacienta uspavajo.
- **Paraliza:** Nevromišični zaviralci, kot sta suksametonij (sukcinilholin) ali rokuronijev bromid, sprostijo mišice, odvzamejo pacientu reflekse in s tem dihanje, kar olajša intubacijo.

4. **Sellickov manever (neobvezen)**

- Pritisk na krikoidni hrustanec se uporablja za zmanjšanje tveganja aspiracije, vendar je uporaba tega manevra čedalje manj pogosta zaradi pomanjkanja trdnih dokazov o njegovi učinkovitosti.


ZAPISKI

SCENARIJ 2/06: SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA (OZKI QRS)

Klic 112: *»48-letna pacientka je prišla v ambulanto osebnega izbranega zdravnika zaradi palpitacij, ki so se pojavile danes, občasno prenehajo in se spet pojavijo. Trenutno ima občutek stiskanja v grlu. Prestrašena je in hitro diha.«*

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
A – prosta.	Ocena dihalne poti.		
B: FD – 28/min, hiperventilira, avskultatorno normalno slišno dihanje, SaO_2 – 100 %.	Avskultacija, SaO_2 na prst.		
C: KT – 100/50 mmHg, SF – 180/min, slišen reden ritem, EKG – SVT.	Tipanje pulza radialno, merjenje KT, EKG monitoring.	Široka i.v. pot – 1 x NaCl 0,9 % 500 ml, vagalni manevri – neuspešni (masaža karotidnega sinusa, pihanje v 5 ccm brizgo), **Adenozin 6 mg (če ni izboljšanja 12 mg, sledi 18 mg) i.v. hitro.**	KT = 80/40 mmHg, omotica.
D: GCS 15, zenici enako široki, simetrični, reaktivni, glukoza – 5,0 mmo/l, GCS – 15, pogovorljiva.			
E – afebrilen.			
Ponovna ocena ABCDE			
A – prosta.			
B: FD – 24/min, SaO_2 – 99 %.	Avskultacija.		
C: 80/min, KT – 120/80 mmHg.	Merjenje KT, poslušanje srca, snemanje EKG.		

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
DISKUSIJA Priprava za EK.	**Znaki hude prizadetosti:** - SF > 150/min, - KT < 90 mmHg, - znaki srčnega popuščanja, - bolečina v prsnem košu. Indikacije za elektrokonverzijo (70–120 J) – priprava, sedacija, analgezija.	**Zdravila za sedacijo in analgezijo odmerki:** **Midazolam (Dormicum):** 0,1–0,3 mg/kg (5 ml = 5mg), **Ketamin (KetanestS):** 0,5–1 mg/kg (1 amp. = 50 mg/2 ml) – sedacija 0,125–0,25 mg/kg – analgezija, **Etomidate:** 0,2–0,3 mg/kg (1 amp. = 20 mg), **Fentanyl:** 2–3 mcg/kg (pazi nizek KT) 1 amp. = 100 mcg/2 ml), **Piritramid:** 0,2 mg/kg (1 amp. =2 ml = 15 mg) **Tiopental:** 3–5 mg/kg (1 amp. = 500 mg ali 1000 mg), **Morfij:** 2 mg.	



Slika 6: EKG zapis – supraventrikularna tahikardija

Vir: https://litfl.com/wp-content/uploads/2018/08/Slow-Fast-Typical-AVNRT.jpg

ZAPISKI

SCENARIJ 2/07: HIPOVOLEMIJA (KRVAVITEV IZ PREBAVIL)

Klic 112: *»82-letni pacient, oskrbovanec DSO, je izrazito oslabel, bled in poten, je v pol sedečem položaju v postelji.«*

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
A – prosta.	Ocena dihalne poti.		
B: FD – 30/min, pospešeno avskultatorno normalno slišno dihanje, SaO_2 – 89 %.	Avskultacija, SaO_2 na prst.	Kisik.	
C: KT – 90/50 mmHg, SF – 130/min, slišen reden ritem, EKG – sinusna tahikardija. Bleda, potna koža, kapilarna polnitev – 4 s.	Tipanje pulza radialno, merjenje KT, EKG monitoring.	Vodoravni položaj, široka i.v. pot 2 x – 0,9 % NaCl 500 ml, Pantoprazol (Nolpaza) – 40 mg i.v.	KT – 70/40 mmHg, slabo odziven.
D: GCS 13, zenici enako široki, simetrični, reaktivni, glukoza – 5,0 mmol/l.			
E – afebrilen, ob pregledu najdemo masivno meleno.	Pregled telesa.	Nadomeščanje tekočin.	
Ponovna ocena ABCDE			
A – prosta.			
B: FD – 24/min, SaO_2 – 99 %.	Avskultacija.		
C: SF – 80/min, KT – 120/80 mmHg.	Merjenje KT, poslušanje srca, snemanje EKG.		
Priprava na transport.			

DISKUSIJA

Krvavitve v prebavila so lahko življenjsko ogrožajoča nujna stanja, ki zahtevajo hitro prepoznavo, diagnostiko in zdravljenje. Delimo jih na krvavitve iz **zgornje prebavne poti** (krvavitve iz požiralnika, želodca in dvanajstnika) in **spodnje prebavne poti** (iz tankega črevesa, debelega črevesa in danke).

1. Klinični znaki in simptomi krvavitev v prebavila

Hematemeza: Bruhanje sveže krvi ali „kavne usedline" (značilno za zgornje prebavne krvavitve).

Melena: Črno, smolnato blato (pogosto posledica krvavitev iz zgornjih prebavnih poti).

Hematohezija: Sveža kri ali krvava driska (značilno za spodnje prebavne krvavitve).

Simptomi hipovolemije:

- bledica, potenje,
- tahikardija,
- nizek krvni tlak (hipotenzija),
- zmedenost, omotica ali izguba zavesti.

2. Etiologija krvavitev

Krvavitev iz zgornje prebavne poti:

- peptični ulkus (najpogostejši vzrok),
- erozivni gastritis ali ezofagitis,
- varice požiralnika in želodca (pogosto pri portalni hipertenziji),
- Mallory-Weissov sindrom (razpoka sluznice požiralnika zaradi močnega bruhanja),
- tumorji (npr. karcinomi želodca ali požiralnika).

Krvavitev iz spodnje prebavne poti:

- divertikuloza (najpogostejši vzrok pri starejših),
- angiodisplazija (vaskularne malformacije),
- vnetne črevesne bolezni (npr. Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis),
- rak črevesja (kolorektalni karcinom),
- hemoroidi ali analne fisure.


ZAPISKI

SCENARIJ 2/08: TAHIKARDIJA (ŠIROKI QRS - HIPERKALIJEMIJA)

Klic 112: *»68-letni pacientki razbija srce in jo tišči v prsnem košu ter pospešeno diha.«*


Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
A – prosta.	Ocena dihalne poti.		
B: FD – 45/min, avskultatorno normalno slišno dihanje, SaO_2 – 80 %.	Avskultacija, SaO_2 na prst.	Kisik 100 %.	Komaj diha, SaO_2 – 70 %.
C: KT – 95/60 mmHg, SF – 200 utripov/min, slišen reden ritem, EKG – VT, tipni pulzi.	Tipanje pulza radialno, merjenje KT, EKG monitoring, potreba po konverziji.	i.v. pot – 1 x 0,9 % NaCl 500 ml, priprava za konverzijo: - elektrode (ekstremitetne in defibrilacijske), - Syncro način. Zdravila (priprava po zdravnikovem naročilu): - Etomidate 10 mg, - Midazolam: 2 mg, - Fentanyl: 50 mcg, - Torecan 6,5 mg. Konverzija: 150 J.	KT – 70/40 mmHg, omotica.
D: GCS 15, zenici enako široki, simetrični, reaktivni, glukoza – 4,8 mmol/l, GCS – 3; sedirana.			
E – afebrilen.	Pridružene bolezni: sladkorna, povišan tlak.		
Ponovna ocena ABCDE			
A – prosta.			
B: FD –12/min, SaO_2 – 95 %.	Avskultacija.	Asistirana ventilacija z dihalnim balonom in 100 % kisik.	
C: SF – 110/min, KT – 110/70 mmHg.	Merjenje KT, poslušanje srca, snemanje EKG, POCT.	EKG – visoki T, široki QRS, odsotni P.	Motnja zavesti, srčni zastoj - VF.
D: glukoza – 6,7 mmol/l.			

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
DISKUSIJA **Ukrepi, elektrokonverzija**	**Znaki hude prizadetosti:** - SF > 150/min, - KT < 90 mmHg, - znaki srčnega popuščanja, - bolečina v prsnem košu. Indikacije za elektrokonverzijo – priprava. Sedacija, analgezija.	**Midazolam (Dormicum):** 0,1–0,3 mg/kg (5 ml = 5mg), **Ketamin (KetanestS):** 0,5–1 mg/kg (1 amp. = 50 mg/2 ml), **Etomidate**: 0,2–0,3 mg/kg (1 amp. = 20 mg), **Fentanyl**: 2–3 mcg/kg (pazi nizek tlak) 1 amp. = 100 mcg/2 ml), **Piritramid**: 0,2 mg/kg (1 amp. = 2 ml = 15 mg), **Thiopental**: 3–5 mg/kg (1 amp. = 500 mg ali 1000 mg), **Morfij**: 2 mg.	
Ukrepi hiperkalemija z EKG spremembami	Odvzem krvi v zeleno epruveto – POCT, široka venska pot, monitoring.	**Kalcijev glukonat:** 30 ml 10 % kalcijevega glukonata, 25 g 10 % **glukoza + 10 IE inzulin** (15–30 min), **Ventolin** 10–20 mg v pršilu.	



Slika 7: EKG zapis – ventrikularna tahikardija s tipnim utripom

Vir: https://litfl.com/ventricular-tachycardia-monomorphic-ecg-library/



Slika 8: EKG zapis – hiperkalijemija

Vir: https://litfl.com/wp-content/uploads/2018/08/ECG-Hyperkalaemia-peaked-T-waves-serum-potassium-7.0.jpg

Postopek sinhrone elektrokardioverzije

Priprava na postopek

1. Priprava opreme:

- monitor/defibrilator z zmogljivostjo elektrokardioverzije,
- samolepilne elektrode za izvedbo konverzije,
- vir kisika, če je potreben,
- oprema za spremljanje pacientovega EKG-ja in življenjskih funkcij,
- analgetiki ali sedativi.

2. Priprava pacienta:

- Pacienta pomirimo in pojasnimo postopek.
- Preverimo in očistimo kožo na mestu pritrditve elektrod (običajno anterolateralni položaj).

Izvedba postopka

1. Nalepimo ekstremitetne EKG elektrode in terapevtske elektrode za izvedbo elektrokonverzije.
2. Priključitev na defibrilator/monitor: elektrode povežemo z defibrilatorjem.
3. Analgezija in sedacija: elektrokonverzija je boleča, zato se pri zavestnih pacientih lahko uporabijo analgetiki ali sedativi (npr. midazolam, etomidate in fentanil).
4. Defibrilator preklopimo na način **„SYNC“** (sinhronizirano praznjenje). Naprava zazna vrh R-vala in električni šok prilagodi, da se izogne fazi konverzije na T-val.

5. Pred izvedbo postopka se prepričajmo, da ni stika s pacientom ali opremo.
6. Aktivirajmo sinhroniziran šok.
7. Po električnem sunku preverimo EKG in klinični status pacienta.

ZAPISKI

SCENARIJ 2/09: ELEKTROLITSKE MOTNJE (HIPONATREMIJA)

Klic 112: »*55 let stara gospa je v vročem dnevu delala na polju, zaradi slabosti je poskušala priti domov. Najdena je na dovozni cesti. Že dan prej je imela drisko (večkrat). Zaradi oslabelosti je padla. Gospa ima v anamnezi težave z želodcem in črevesjem.*«

Prvi vtis: Gospa leži na kavču, slabo odzivna, zmedena, ni pogovorljiva. Ima buško na zatilju. Izbruhala je za vzorec temne vsebine.

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
A – prosta.	Ocena dihalne poti.		
B: FD - 30/min, avskultatorno normalno slišno dihanje, SaO_2 – 89 %.	Avskultacija, SaO_2 na prst.	Kisik 60 % – SaO_2 se dvigne na 95 %.	Tahipnoična, SaO_2 – 80 %.
C: KT – 75/40 mmHg, SF – 120/min, slišen reden ritem, EKG – sinus tahikardija.	Tipanje pulza radialno, merjenje KT, EKG monitoring.	i.v. pot – 2 x, 0,9 % NaCl 500 ml + 500 ml. Th: Pantoprazol (Nolpaza) – 40 mg i.v., Metoklopramid (Reglan) 1 amp. i.v., Somatostatin, 0,25 mg i.v.	KT– 70/(?) mmHg, neodzivna, PEA.
D: GCS 6, zenici enako široki, simetrični, reaktivni, glukoza – 4,8 mmo/l, GCS – 3 sedirana.	Zagotovitev proste dihalne poti.	RSI: Midazolam, Fentanyl, Sukcinilholin in podaljšanje z Rocuronijem bromidom. Vazoaktivna podpora z noradrenalinom/adrenalinom.	Neodzivna, GCS – 3.
E: pregreta, potna koža.	Nima alergij, nima redne terapije, POCT.	Elektroliti: **Na = 110 mmol/l (-).**	
Ponovna ocena ABCDE			
A – prosta.			
B: FD – 12/min, SaO_2 – 95 %.	Avskultacija.	Ventilator, Vt : 6–8 ml/kg, FD – 12/min, tlak: 35 kPa.	
Ukrepi hiponatremija	Odvzem krvi v zeleno epruveto – POCT. Široka venska pot, monitoring.	**Nadomeščanje elektrolitov (Na):** 150 ml 3 % NaCl v 20 minutah i.v. Pozor: 0,9 % NaCl ni primeren za nadomeščanje Na+.	

DISKUSIJA

Natrij je ključni elektrolit za vzdrževanje osmotskega ravnovesja, volumna zunajcelične tekočine in normalnega delovanja celic, zlasti živčnih celic. Ko je koncentracija natrija prenizka (serumski natrij < 120 mmol/L), voda vstopa v celice, kar vodi v otekanje celic, vključno z možganskimi celicami.

Simptomi hude hiponatrijemije so:

1. **Nevrološki simptomi:**

- glavobol,
- zmedenost, dezorientacija,
- slabost, bruhanje,
- mišični krči ali trzanje,
- spremenjena zavest (letargija, stupor, koma),
- epileptični napadi.

2. **Sistemski simptomi:**

- slabost,
- utrujenost,
- hipotenzija ali šok (pri hipovolemični hiponatremiji),
- znaki prekomerne hidracije (pri hipervolemični hiponatremiji), kot so edemi.

Najpogostejši razlogi za hiponatremijo so gastrointestinalne izgube (bruhanje, driska), prekomerno potenje, diuretična terapija (npr. tiazidi) in Addisonova bolezen (adrenalna insuficienca).

Priprava 3 % raztopine NaCl:

- uporabimo 250 ml 0,9 % NaCl,
- odvzamemo 125 ml osnovne raztopine,
- ostanku dodamo 125 ml 1M NaCl.

ZAPISKI

SCENARIJ 2/10: POŠKODBA Z MOTNJO SRČNEGA RITMA

Klic 112: »*55 let star gospod je padel na kolesarski stezi, verjetno vinjen.*«

Prvi vtis: Gospod leži na boku na pločniku, ob njem skiro in trije policisti, ki jemljejo anamnezo. Na prvi pogled ni poškodovan. Pristop od spredaj, prijem glave.

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
Varnost, oprema	Pristop s sprednje strani.	Primemo glavo in ogovorimo.	Pokličemo brez varovanja glave.
Zavest – **P**	Glasno ogovorimo.	Premikamo okončini in govorimo.	
A – odprta.	Samostojno govori.	/	
B: FD – 20/min, slabša perfuzija, SaO_2 – 95 %.	SaO_2 na prst.		
C: KT – 100/65 mmHg, SF – 200/min, slišen reden tahikarden ritem, bleda koža, kapilarna polnitev – 3 s.	Tipanje pulza radialno, koža bleda, hladna (leži zunaj na pločniku).	Vodoravni položaj, pregled roke: i.v/i.o. pot – 0,9 % NaCl 500 ml.	KT – 80/40 mmHg, utrip – 200/min, slabo odziven.
ITLS pregled	Brez vidnih poškodb.	Imobilizacija zaradi mehanizma.	
Imobilizacija	Obračanje v osi, pregled hrbtenice.	Nameščanje na zajemalna nosila.	
D	AVPU – A, glukoza 9,0 mmo/l, zenici enako široki, reaktivni, znakov lateralizacije ni.		
E – afebrilen.	Zadaha po alkoholu ni, na telesu ni vidnih edemov, ran.		
SAMPLE	Zdravi se zaradi psihičnih težav.	S – utrujen, A – 0, M – našteje različna psihiatrična zdravila, P – občasne težave z živci, L – 1 ura, E – šel naj bi v trgovino.	
Ponovna ocena ABCDE v NRV			
ZAVEST – U	Ob priklopu na monitor, vidna **VF**, gospod se neha odzivati.		
A – prosta.	Ker so poškodbe izključene, zvračanje glave.	Sprostimo dihalno pot.	
B + C – agonalno dihanje, utrip ni tipen.	Ocena dihanja in utripa – stisi prsnega koša. Pripravimo defibrilator.	Stisi na sredini prsnega koša 100–120/min, namestitev defibrilacijskih elektrod.	
C: VT/brez pulza.	Ocena ritma na monitorju.	Varna defibrilacija – 200 J.	

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
	Stisi prsnega koša.		
	Gospod se odziva, se pogovarja, dihanje 12/min.	EKG – VT.	
C: SF – 200/min, KT – 80/40 mmHg.	Priprava na elektrokonverzijo Analgezija: Piritramid 7,5 mg i.v./ Etomidate 0,1–0,2 mg/kg Midazolam 1–2 mg i.v.	Elektrokonverzija – 150 J (Sychro tehnika).	
Ponovna ocena ABCDE	A – prosta. B – zaradi sedacije asistirana ventilacija, O_2 – 90 %. C – utrip 50 /min, RR- 90/50, EKG – STEMI spodnje stene.	Asistirano umetna ventilacija z dihalnim balonom in 100 % kisikom. Snemanje EKG. Merjenje tlaka.	
Klic sprejemna bolnišnica	Katetrski laboratorij, Tikagrelor (Brilique) – 180 mg – lahko p.o., ko je buden, Heparin 5000 ie. ASA (Aspirin) 300 mg p.o. – če je buden, (Aspegic) – 300 mg i.v. – če ni buden.	Aplikacija zdravil.	
Odločitev za transport.	HNMP	Zahteva za HNMP – zaradi megle ne letijo. Transport po cesti z NRV.	

DISKUSIJA

Motnje srčnega ritma (aritmije) so lahko prav tako razlog za poškodbe. Zaradi znižane funkcije črpalke se zniža minutni volumen, pride do hipoperfuzije organov, hipoksije tkiv (možgan) in motnje zavesti. Posledično se voznik iz neznanega razloga zaleti v objekt, kolesar nenadoma pade, pešec se nenadoma zgrudi in doživi sinkopo. Pri vseh poškodovancih je zato smiselno opraviti EKG zapis, predvsem, če pridobimo v anamnezi podatek, da je mehanizem bil nenaden, nepričakovan, iz neznanega razloga, udarnina v prsni koš in so prisotni simptomi kot npr. bolečina v prsnem košu, tahikardija, bradikardija ali druga oblika aritmije.

ZAPISKI

SCENARIJ 2/11: ZASTRUPITEV Z OPIATI


Klic 112: Dispečerski center pošlje aktivacijsko sporočilo: *»V čakalnici železniške postaje Zidani Most leži mlajše dekle, naj bi bila neodzivna in težko diha.«*

Prvi vtis: Ura je 7.40 zjutraj. Prometnik pove, da je dekle šlo v čakalnico, ker je dlje časa ni bilo ven, je šel pogledat. Ocenjena starost 25–30 let, neznanka, leži negibno na hrbtu na klopi, ima cianotične ustnice, bruhala. Ocena AVPU – P (fleksijski odgovor na močno bolečino).

Varnost: varen pristop, vidnih nevarnosti ni zaznati, uporaba osebne varovalne opreme.

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
A – nezaščitena.	Smrčanje, grgranje.	Aspiracija in toaleta dihalne poti, sprostitev dihalne poti (bočni položaj ali ročni manever).	Zastoj dihanja.
B: dihanje neredno 6/min, cianoza, avskultatorno slišno hropenje, SaO_2 – 79 %.	Asistirana umetna ventilacija, avskultacija, SaO_2 na prst.	Kisik 100 %.	SaO_2 – nemerljiva, agonalno dihanje.
C: KT – 94/52 mmHg, SF – 48/min, ritem reden, EKG – sinusna bradikardija, 48/min.	Tipanje pulza radialno, merjenje KT, EKG monitoring, 12-kanalni EKG.	Vzpostavitev proste i.v. poti, infuzija 0,9 % NaCl 500 ml.	
D: GCS 5 (E1,V1, M3), glukoza – 6,4 mmol/l, zenici: mioza, nereaktivni na svetlobo, ocena AEIOU – opiati.	Ocena zavesti (AVPU, GCS), merjenje glukoze, ocena zenic.	Antidot za opiate: Narcanti (Naloxon, Nexdonal) – 0,4 mg i.v.	
E – koža hladna, na podlakti vidni znaki vbodov, na stranišču najdeni pripomočki za zlorabo trdih drog – heroin (?), T – 35 °C.	Aktivacija policije, pregled okolice, Heteroanamneza.	Pokrivanje.	
Ponovna ocena ABCDE	**Izboljšanje stanja**		
A – prosta.			
B – 12/min, SaO_2 – 98 %.	Avskultacija, merjenje saturacije.	Kisik.	Dihalni zastoj.
C: SF – 90/min, KT – 110/60 mmHg, EKG – sinusni ritem.	Merjenje KT, EKG.		

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
D: GCS – 9 (E2,V2,M5), zenici ozki, vendar reaktivni na svetlobo.	Ocena GCS, ocena reakcije zenic, po aplikaciji antidota se začne prebujati, stoka, premika okončine.	Pripraviti še en odmerek Narcanti (Naloxona) 0,4 mg (opiati imajo daljšo razpolovno dobo).	Ponovno postane neodzivna, neredno dihanje.
E: T – 35,8 °C.	Priprava na transport, konzultacija s toksikologom (pp).	Transport v UC, pridobitev anamneze, obveščanje svojcev.	
DISKUSIJA	**Prepoznamo opiatni toksindrom:** - depresija CŽS, - hipoventilacija, - mioza. Varno odstranimo okužene igle, brizge in druge pripomočke za aplikacijo heroina. Zagotovimo zadostno oksigenacijo in ventilacijo. Apliciramo antidot, če je na voljo - Narcanti, pacienta prebujamo počasi, nevarnost agresivne reakcije. Upoštevamo daljšo razpolovno dobo opiatov od Narcantija, pripravimo dodaten odmerek. Izvajamo stalen nadzor in monitoring pacienta. Aktivacija policije.		



Slika 9: EKG zapis – sinusna bradikardija

Vir: https://litfl.com/wp-content/uploads/2018/08/ECG-Sin-us-bradycardia.jpg

ZAPISKI

SCENARIJ 2/12: ZASTRUPITEV Z METANOLOM


Klic 112: Dispečerski center pošlje aktivacijsko sporočilo: *»Več oseb zmedenih, opitih, nekateri bruhajo. Fantovščina. Možna zastrupitev z ogljikovim monoksidom – uporabljajo kamin. Aktivacija gasilcev.«*

Prvi vtis: Ob prihodu ekipe najdejo tri moške srednjih let v stavbi, več oseb moškega spola pred stavbo. Na mizi veliko steklenic, v katerih naj bi se nahajalo domače žganje, sadjevec in vino**.** Eden od njih je močno zmeden, naj bi imel težave z očmi.

Varnost: Osebe so opite, vendar niso agresivne. V stavbi detektor CO ne pokaže prisotnosti plina.

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
A – prosta, govor počasen, zmeden.			Nevarnost bruhanja, aspiracije.
B: FD – 26/min, globoko, kussmaulovo, avskultatorno slišno enako obojestransko, SaO_2 – 94 %.	Avskultacija, SaO_2 na prst.		Motnja zavesti, krči.
C: KT – 108/65 mmHg, SF – 112/min, ritem reden, EKG – sinusna tahikardija, 112/min.	Tipanje pulza radialno, merjenje KT, EKG monitoring, 12-kanalni EKG, odvzem krvi za POCT.	Vzpostavitev proste i.v. poti, infuzija 0,9 % NaCl 500 ml. Venski odvzem krvi - zelena epruveta – POCT.	Motnja zavesti, krči, kardiovaskularni kolaps.
D: GCS 14 (E1,V1,M3), zmeden, neorientiran v času in prostoru, meglen vid (sneženje), glukoza – 5,9 mmol/l, zenici: srednje široki, reaktivni na svetlobo, ocena AEIOU – alkohol.	Ocena zavesti (AVPU, GCS), merjenje glukoze, ocena zenic, POCT – prepoznamo metabolno acidozo.		Motnja zavesti, krči.
E – koža topla, pordela, T – 37 °C.	Anamneza: naj ne bi uživali nedovoljenih drog ali drugih poživil, v steklenicah »domače žganje«, možnost prisotnosti METANOLA.	Konzultacija s toksikologom, aktivacija policije. Priprava na transport.	Motnja zavesti.
Ponovna ocena ABCDE			
A – prosta.	Zmedeno govori, opit.		
B: FD – 30/min, pospešeno, SaO_2 – 98 %.	Avskultacija, merjenje saturacije.	Pripraviti pripomočke za oskrbo dihalne poti v primeru potrebe.	Motnje zavesti.
C: SF – 120/min, KT – 110/60 mmHg, EKG – sinusni ritem, tahikardija.	Merjenje KT, EKG.		

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
D: GCS 14 (E1,V1,M3), zmeden, neorientiran v času in prostoru, meglen vid.	Ocena GCS, ocena reakcije zenic, ocena vida.	V primeru suma na zastrupitev z metanolom in ohranjene zavesti: Antidot: 100 ml 40 % etanol p.o; v UC – fomepizol i.v.	
E: T – 37,2 °C.	Priprava na transport.	Transport v UC.	
DISKUSIJA	Ob uporabi domače pripravljenih alkoholnih pijač pomislimo na možnost zastrupitve z metanolom. Znaki: zmedenost, motnje vida (snežni metež) in pospešeno dihanje brez nizke saturacije – znaki metabolne acidoze. Zagotovimo zgodnji transport v UC, nadzor življenjskih funkcij. Antidot: **Etanol 40 % p.o. ob povsem ohranjeni zavesti, v bolnišnici Fomepizol, v primeru težke zastrupitve dializa.** **Presnova metanola:** - Razgradnja v jetrih – ADH (90–95 %), - metanol > formaldehid > mravljična kislina > CO2 in H2O, - čas razgradnje 14–20 ur do 30–35 ur, - smrtnost 20 %, 20–25 % okvare vida. **Takojšnji učinek** (1–2 uri): - znaki vinjenosti. **Zgodnji potek** (6–12 ur): - navzea, bruhanje, bolečine v trebuhu, glavobol, vrtoglavica, zmedenost, letargičnost, meglen vid. **Pozni potek** (12–24 ur): - slepota, tonično-klonični krči, koma, depresija dihanja in smrt. **Posledice:** Povečana osmolarna vrzel in metabolna acidoza. **Ugotavljanje in obravnava metabolne acidoze na terenu**: Metabolna acidoza pomeni primarno znižanje **HCO_3^- /bikarbonata**, običajno z znižanim pH in kompenzacijskim hitrejšim dihanjem oziroma nižjim CO_2. Razvrščamo jo na **metabolno acidozo z visokim anionskim primanjkljajem** in **z normalnim anionskim primanjkljajem**. Na terenu jo potrdimo samo, če imamo **POCT plinsko analizo arterijske krvi npr**: pH < 7,35, HCO_3^- znižan, pogosto < 22 mmol/L, BE/primanjklaj baz negativen, pCO_2 znižan, če pacient ustrezno kompenzira s hiperventilacijo. Laktacidoza je običajno: laktat > 4 mmol/L + pH < 7,35 oziroma prisotna metabolna acidoza.	



Slika 10: EKG zapis – sinusna tahikardija

Vir: https://litfl.com/sinus-tachycardia-ecg-library/

ZAPISKI

PRISTOP IN OSKRBA KRITIČNO BOLNEGA OTROKA

Učni cilji

Po zaključku scenarija bo udeleženec zmožen:

- ☐ razdeliti ključne vloge v timu in uporabiti jasno timsko komunikacijo in komunikacijo s starši;
- ☐ prepoznati klinično sliko in stopnjo ogroženosti otroka;
- ☐ izvesti oceno stanja otroka, pri tem uporabiti strukturiran pristop ABCDE in povezati vitalne znake, anamnezo in prepoznano simptomatiko;
- ☐ določiti prednostno zaporedje ukrepov ter izvesti postopke in posege v okviru kompetenc ali po naročilu zdravnika;
- ☐ zagotoviti kontinuiran monitoring, najavo v sprejemni ustanovi in strukturirano predajo pacienta.

Strokovna priporočila in smernice

Scenariji se nanašajo na priporočila Evropskega reanimacijskega sveta za otroke EPLS 2025 (ang. European Pediatric Life Support).

Splošna vprašanja ob koncu vsakega scenarija

- Kateri podatki so vas najprej usmerili k pravilni prepoznavi kliničnega problema v scenariju?
- Kateri ukrep je bil v prvih minutah časovno najbolj kritičen in zakaj ste ga izvedli v izbranem zaporedju?
- Kje v tem scenariju bi lahko nastala najpomembnejša varnostna napaka in kako bi jo preprečili?
- Kako je potekala razdelitev vlog, komunikacija znotraj tima in predaja informacij ter kaj bi ob ponovitvi scenarija izvedli drugače?

SCENARIJ 3/01: HIPOTERMIJA

Klic 112: »*Iz ribnika so potegnili otroka, vdrl se mu je led.«*

Otrok, star 5 let (18 kg), je bil izvlečen iz ledene vode, po tem, ko se mu je vdrla ledena ploskev. Zunanja temperatura znaša **–**10 °C. Mehanizem poškodbe je lokaliziran.

Prvi vtis: Otrok leži negibno na bundi očividca, ves premražen in premočen.

Pristop: Pristop od spredaj, prijem za glavo, ocena zavesti, ABC.

A: nekaj tekočine v ustih – aspiracija dihalnih poti.

B: agonalno dihanje 4/min – ocena do 1 min – 5 začetnih vpihov – ni izboljšanja, SpO_2 – nemerljiv.

C: ocena pulza – ni centralnega utripa – ocena do 1 min.

Ukrepi:

- Po 5 začetnih vpihih pričetek stisov prsnega koša, razmerje 15 : 2 s kisikom.
- Odločitev za prenos v ogreto vozilo.
- Odstranjevanje oblačil s površine prsnega koša.
- Brisanje prsnega koša.
- Nameščanje samolepljivih elektrod - AL/AP pozicija.
- Na monitorju bradikarden ritem 30/min, ozki ORS, utripi niso tipni.
- Vzpostavitev i.v. / i.o. poti.
- Dovajanje ogrete tekočine 0,9 % NaCl; 10 ml/kg TT – 180 ml.
- Merjenje temperature: 31 °C.
- Adrenalin 0,18 mg (0,2 mg)/3–5 min i.v. (v 2 min).
- Ogrevanje z grelno blazino.
- Ocena 4H/4T.
- Po 6 minutah ponovno adrenalin 0,2 mg.
- Po 8 minutah na monitorju VF – izvedba defibrilacije 70 J.
- Preskok v bradikarden ritem, ozki QRS (PEA) 50/ min.
- Nadaljevanje TPO 2 min.
- Po 10 minutah na monitorju bradikarden ritem ozki QRS, 50/min,
- Ocena ritma: C – centralni utrip tipen, A – prosta, B – ne diha, neodziven.
- Odločitev za dokončno oskrbo dihalne poti – ETI (velikost tubusa – 4,5 mm, $ETCO_2$ – 35 mmHg.
- Priklop na ventilator (parametri – frekvenca dihanja = 20/min, Vmin = 2500 ml) Vt = 6–8 ml/kg = 125 ml.
- Priprava na transport – ponovna ocena ABCDE (glukoza 4,5 mmol/l), GCS – 3, zenici enako široki, simetrični, reaktivni.
- Najava v pediatrični urgentni center, zahteva po pripravi zunajtelesnega krvnega obtoka (ECMO).

DISKUSIJA

Posebnosti oživljanja podhlajene osebe

Smernice za oživljanje podhlajenih oseb (ERC 2025 – European Resuscitation Council) poudarjajo posebne prilagoditve pri ravnanju z osebami, ki so v stanju hipotermije.

Ocena dihanja in cirkulacije: Pri podhlajenih osebah je lahko srčni utrip zelo počasen in težko zaznaven, oceno življenjskih znakov ocenimo v intervalu do ene minute. Če nismo prepričani o prisotnosti pulza ali dihanja, takoj začnimo z oživljanjem.

Stisi prsnega koša in umetna ventilacija potekata v enakem razmerju in z enakimi frekvencami kot v normalnih razmerah.

Defibrilacija: Če je telesna temperatura jedra < 30 °C, izvedemo do tri defibrilacije, če so te priporočene. Nadaljnje defibrilacije izvedemo, ko je pacient ogret vsaj na 30 °C.

Zdravila: Reanimacijska zdravila dajemo prvi odmerek takoj, nato pa, ko je telesna temperatura jedra vsaj 30 °C. Do dosežene temperature 35 °C je interval med dajanjem zdravil 2-krat daljši.

Pacienta ves čas ogrevamo: topel prostor, topla pokrivala, grelne blazine, tople infuzije.

Pri osebah s hudo hipotermijo in brez znakov življenja mora oživljanje trajati, dokler se telesna temperatura ne dvigne na 32–35 °C. Telesno temperaturo merimo s termometrom, ki ima prilagojeno nižjo lestvico meritve.


Stopnje pohladitve:

Stopnja I (blaga, T ≥ 32–35 °C): zmanjšana zavest, drgetanje.

Stopnja II (zmerna, T 28–32 °C): zaspanost, odsotnost drgetanja, upočasnjeno dihanje.

Stopnja III (huda, T 24–28 °C): neodzivnost, ohranjeni življenjski znaki.

Stopnja IV (izjemno huda, T < 24 °C): navidezna smrt, brez zaznavnih znakov življenja.



Slika 11: EKG zapis – Sinusna bradikardija z izraženimi Osbornovimi zobci

Vir: https://litfl.com/wp-content/uploads/2022/01/Osborn-wave-temp-26-example-4.png

ZAPISKI

SCENARIJ 3/02: BRONHIOLITIS

Klic 112: »*Dojenček, star dva meseca (5 kg), je zadnjih nekaj dni neješč, ima temperaturo 37,8 °C, diha z naporom, začelo se je kot prehlad, kašlja.«*

Prvi vtis (premikanje, dihanje, barva kože): Otrok leži, diha s pomožnimi mišicami, prsni koš se mu ugreza, je bled in odsoten.

Pristop:

- **Varnost.**
- **Zavest** – reakcija na bolečino (P).
- **A** – dihalna pot delno zaprta, polno sline in sekreta – aspiracija.
- **B** – dihanje 60/min (glej, poslušaj, občuti – LLF; frekvenca dihanja, dihalno delo, dihalni volumen, oksigenacija - RWTO) – asistirana ventilacija (25 vdihov/min), SaO_2 – 70 %, dodajanje kisika 100 %.
- **C** – ocena frekvence in 4P: SF – 180/min, KT – 70/(?) mmHg, kapilarna polnitev 4 s, vratne vene prazne, hladne okončine.

UKREPI:

A – odpiranje dihalne poti, aspiracija sekreta.

B – kisik, asistirana ventilacija, razmislek o ETI, otrok diha s prepono, vidne retrakcije dihalnih mišic na prsnem košu, ugrezanje prsnega koša, SEE/SAW dihanje.

C – i.v./i.o. pot, bolus tekočine 50 ml 0,9 % NaCl, EKG.

D – GCS – 7, glukoza 4,0 mmol/l, zenici enako široki, simetrični, reaktivni.

E – brez sprememb.

Endrotrahealna intubacija (ETI) – zdravila (analgezija, sedacija, relaksacija), velikost tubusa 3 mm, globina 10 cm (glej prilagoditve za otroke).

Ponovna ocena ABC:

A: odprta, vstavljen endotrahealni tubus št. 3.

B: dihanje 20/min, umetna ventilacija.

C: SF – 150/min; KT – 80/30 mmHg.

Izvajanje kontinuiranega monitoringa in najava v pediatrični urgentni center.

DISKUSIJA

Bronhiolitis: Izcedek iz nosu in kašelj, povišana temperatura, povzročitelj RSV, poveča se dihalno delo, otrok odklanja hrano in tekočine. Znaki hude prizadetosti: ugrezanje prsnega koša, tahipneja, širjenje nosnih kril, nad pljuči slišni drobni poki v inspiriju in ekspiriju. Zaradi izčrpanosti postanejo dihalni fenomeni bolj tihi vse do tihega prsnega koša, kar vodi v bradikardijo, bradipnejo, motnjo zavesti, cianozo in dihalni zastoj.

Ukrepi: kisik (vzdrževanje saturacije med 94–98 %) in nadomeščanje tekočin (kristaloidi) 10 ml/kg.

SCENARIJ 3/03: EPIGLOTITIS

Klic 112: »*4 leta star otrok (16 kg) ima zadnjih nekaj ur boleče grlo s težkim požiranjem in povišano temperaturo, iz ust mu izteka slina in ima čuden glas.«*

Prvi vtis (premikanje, dihanje, barva kože): Otrok sedi v maminem naročju, izgleda bolan, iz ust mu izteka slina, cianotičen, diha z naporom.

Pristop:

- **Varnost**.
- **Zavest**: buden (A).
- **A**: dihalna pot delno zaprta, hripav glas, nevarnost popolne zapore.
- **B**: FD – 40/min (glej, poslušaj, občuti – LLF; frekvenca dihanja, dihalno delo, dihalni volumen, oksigenacija – RWTO) – zamolkel glas, SaO_2 – 88 %, težje dihanje.
- **C**: ocena frekvence in 4P: SF – 150/min, sistolični KT – 90 mmHg, kapilarna polnitev do 2 s.
- **D**: 38,8 °C.

UKREPI:

A – odprta, zamolkel glas.

B – kisik, razmislek o ETI.

C – monitoring IV/IO pot, bolus tekočin 160 ml 0,9 % Na Cl.

Ob nameščanju monitorja: poslabšanje.

Ponovna ocena ABC:

A: odprta,

B: dihanje 10/min,

C: 90/min, takojšnja oskrba dihalne poti z ETI (analgezija, sedacija, relaksacija), umetna ventilacija 20/min,

D: GCS – 7, glukoza 5,0 mmol/l, zenici enako široki, simetrični, reaktivni,

E: brez sprememb.

ETI – zdravila, velikost tubusa (glej prilagoditev za otroke).

V primeru neuspele oskrbe: odpoved dihanja, SF – 40/min, PEA – asistolija.

TPO – 5 začetnih vpihov, stisi prsnega koša in umetno dihanje v razmerju 15 : 2.

Adrenalin 0,16 mg v bolusu, ponavljaj na 3–5 minut.

Bolus tekočin: 160 ml.

Razmislimo o ukrepih:

- Laboratorijske preiskave in odvzem krvi za povzročitelja.
- Potreba po prejemu antibiotika.

DISKUSIJA

Epiglotitis: povzročitelj Haemofilus influence tip B; oteklina poklopca, ki delno ali popolno zapre dihalno pot. Otrok se slini, ima pridušen glas (vroč krompir), hiter nastanek poslabšanja, sedeč položaj, povišana temperatura, stridor, dispneja. Kašlja ni. Če želimo otroka endotrahealno intubirati je potrebno izvesti popolno RSI.

ZAPISKI

SCENARIJ 3/04: TAHIKARDIJA (KOMPENZIRANA SVT)

Klic 112: »*4–mesečni dojenček je nekajkrat pomodrel, bil je slabo ješč, potil se je in je v slabem stanju.«*

Prvi vtis (premikanje, dihanje, barva kože): Otrok je buden in težko diha, cianoza.

Pristop:

- **Varnost**.
- **Zavest**: buden (A).
- **A**: dihalna pot odprta.
- **B**: dihanje 60/min (glej, poslušaj, občuti – LLF; frekvenca dihanja, dihalno delo, dihalni volumen, oksigenacija – RWTO) – interkostalne retrakcije, širjenje nosnih kril, dobro dvigovanje prsnega koša, SaO_2 – 90 %, pomodrele ustnice.
- **C**: ocena frekvence in 4P: SF – 230/min, sistolični KT – 80 mmHg, kapilarna polnitev do 4 s, periferni utrip tipen, jugularne vene normalno polnjene.
- **D**: glukoza – 5,0 mmol/l
- **E**: brez izpuščajev, 37 °C.

Ukrepi:

B – kisik 15 l/min, merjenje saturacije.

C – monitoring, EKG, KT, i.v./i.o. pot.


Konzultacija s kardiologom.

Kompenzirana oblika SVT

Zdravila: Adenozin 0,1–0,2 mg/kg; 0,3 mg/kg.

Ponovna ocena ABCDE:

- **Zavest**: buden (A).
- **A**: dihalna pot odprta.
- **B**: dihanje 50/min (LLF, RWTO); SaO_2 – 94 %.
- **C**: ocena frekvence in monitoring – po ukrepih 150/min.
- **D**: glukoza – 5,0 mmol/l.
- **E**: 37 °C.



Slika 9: EKG zapis – stabilna supraventrikularna tahikardija

Vir: https://litfl.com/wp-content/uploads/2018/08/ECG-Case-082-LITFL-Top-100-EKG.jpg

DISKUSIJA

Pri SVT električni impulz ne prihaja normalno iz sinusnega vozla, ampak se pogosto »vrti v krogu« nad prekati. Zato srce bije zelo hitro, navadno 220–300/min. Pri visoki srčni frekvenci se »preload« krvi zmanjša, s tem pa tudi »afterload« krvi.

Dojenček je na začetku lahko še videti »kar v redu«, ker telo stanje kompenzira: poveča tonus žil, ohranja pritisk in usmerja kri k pomembnim organom. Zato govorimo o kompenzirani SVT.

Pri dojenčku lahko opazimo:

- slabo sesanje ali odklanjanje hranjenja,
- potenje pri hranjenju,
- razdražljivost ali nenavadno mirnost,
- bledico,
- pospešeno dihanje,
- utrujenost,
- bruhanje,
- hladnejše okončine,
- še tipne pulze in za zdaj še sprejemljiv kapilarni povratek.

Pri dojenčku s stabilno oziroma kompenzirano SVT se praviloma klasični vagalni manevri ne izvajajo, izjema je izzivanje potapljaškega refleksa s potopitvijo obraza v mrzlo vodo za 5 sekund.

SCENARIJ 3/05: TAHIKARDIJA (DEKOMPENZIRANA SVT)

Klic 112: »*Dojenček, star 2 meseca (4,5 kg), je do zjutraj še bil v redu, pojedel stekleničko mleka, nakar je postajal vedno bolj bled in cianotičen, ni reagiral na dotike.«*

Prvi vtis (premikanje, dihanje, barva kože): Otrok leži negibno, zavest (U), bled.

Pristop:

- Varnost.
- **Zavest**: neodziven (U).
- **A**: dihalna pot odprta, nevtralni položaj glave.
- **B**: dihanje 60/min (glej, poslušaj, občuti – LLF; frekvenca dihanja, dihalno delo, dihalni volumen, oksigenacija – RWTO); simetrično dvigovanje prsnega koša, SaO2 – 92 % (ko uspemo zmeriti).
- **C**: ocena frekvence in 4P: na otip ni možno prešteti frekvence srca, monitor: SF – 260/min – ozki kompleksi, sistolični KT – 50 mmHg, kapilarna polnitev do 5 s, periferni utrip ni tipen, jugularne vene napete.
- **D**: glukoza – 5 mmol/l, GCS – 3-
- **T:** 36,8 °C.

Ukrepi:

A – vzdržujmo odprto dihalno pot.

B – kisik 100 %, podpora asistirana umetna ventilacija.

C – monitoring, SF – 260/min – SVT, ozki QRS, i.v./i.o. pot, potreba po elektrokonverziji (motnje zavesti, znaki srčnega popuščanja, hipotenzija).


Priprava za elektrokonverzijo:

- namestitev elektrod (A/P pozicija),
- izbira SYNCRO tehnike,
- izbira energije 1 J/kg TT – 5 J, v primeru prvega neuspelega poskusa nadalje 2 J/kg, 3 J/kg do največ 4 J/kg,
- izvedba elektrokonverzije.

Po postopku ponovna ocena ABCDE:

- **Zavest**: se prebuja (V) – sledi z očmi.
- **A**: dihalna pot odprta.
- **B**: dihanje 50/min (LLF, RWTO); SaO_2 – 96 %.
- **C**: SF – 180/min – sinusna tahikardija, ozki QRS.
- **D**: GCS – 9.
- **E**: ni sprememb.

Če otrok ostane neodziven razmislimo o ETI.



Slika 10: EKG zapis – cirkulatorno nestabilna supraventrikularna tahikardija

Vir: https://litfl.com/wp-content/uploads/2018/08/ECG-Narrow-complex-tachycardia-12-day-old-Arrival.jpg

DISKUSIJA

Supraventrikularna tahikardija pri dojenčku pomeni, da je tahikardija tako hitra in/ali traja tako dolgo, da otrok ne zmore več vzdrževati ustreznega minutnega volumna srca in sistemske perfuzije. Gre za hemodinamsko nestabilno stanje.

Pri SVT je frekvenca pri dojenčku pogosto nad 220/min, lahko tudi 250–300/min. Zaradi zelo kratke diastole se prekati ne napolnijo dovolj, zato se zmanjša utripni volumen. Sprva otrok kompenzira z vazokonstrikcijo in povečanim simpatičnim tonusom, ob izčrpanju kompenzacijskih mehanizmov pa nastopi dekompenzacija. Če je otrok **hemodinamsko nestabilen**, je ustrezno zdravljenje **sinhronizirana elektrokonverzija.**

Znaki dekompenzacije pri dojenčku:

Srčna frekvenca	**običajno zelo hitra, redna, pogosto > 220/min.**
Ritem	navadno reden, ozkokompleksni QRS; lahko tudi širokokompleksni pri aberaciji.
Koža	bledica, sivkasta barva, marmoriranost, hladne okončine.
Perfuzija	podaljšan kapilarni povratek, šibki periferni pulzi.
Krvni tlak	lahko normalen v začetku, kasneje **hipotenzija** kot pozen znak.
Zavest	letargija, zmanjšana odzivnost, motena zavest.
Dihanje	tahipneja, dihalni napor, znaki respiratorne stiske.
Hranjenje	izrazito slabo sesanje, odklanjanje hranjenja.
Srčno popuščanje	hepatomegalija, potenje, dispneja, lahko znaki pljučne kongestije.
Splošno stanje	otrok je prizadet, izčrpan, slabo odziven ali apatičen.

SCENARIJ 3/06: SEPTIČNI ŠOK

Klic 112: »*2 leti star otrok (12 kg) preboleva gripo, ima temperaturo 40 °C, je odsoten, zavrača pitje tekočine.«*

Prvi vtis (premikanje, dihanje, barva kože): Otrok leži negibno, zavest (P), koža vroča.

Pristop:

- **Varnost.**
- **Zavest**: reagira na bolečino (P).
- **A**: položaj na hrbtu, smrči.
- **B**: FD – 24/min (glej, poslušaj, občuti – LLF; frekvenca dihanja, dihalno delo, dihalni volumen, oksigenacija - RWTO) – simetrično dvigovanje prsnega koša, koža vroča, brez cianoze, SaO_2 – 86 %.
- **C**: ocena frekvence in 4P: SF – 190/min – ozki kompleksi, sistolni KT – 55 mmHg, kapilarna polnitev do 5 s, vroča koža.
- **D**: glukoza 4,9 mmol/l, GCS – 9
- **E**: petehije po koži na vratu in prsnem košu, T – 40 °C.

Ukrepi:

A – vzdržuj odprto dihalno pot.

B – kisik 100 %.

C – monitoring, frekvenca 180/min i.v. ne uspe/i.o. pot uspe na goleni, bolus tekočin 10 ml/kg = 120 ml – ni izboljšanja – bolus ponovimo.

Ponovna ocena ABCDE:

- **Zavest**: se prebuja (V) – sledi z očmi.
- **A**: dihalna pot odprta.
- **B**: dihanje 50/min (LLF, RWTO), SaO_2 – 96 %.
- **C**: ocena SF – 180/min – sinusna tahikardija, ozki QRS.
- **D**: GCS – 12.
- **E**: brez sprememb.

Če otrok ostane neodziven razmislimo o ETI.

DISKUSIJA

Septični šok je stanje, ko okužba sproži sistemski vnetni odziv, zaradi katerega pride do odpovedovanja krvnega obtoka in nezadostne prekrvavitve organov. Pri otroku je to urgentno, življenjsko ogrožajoče stanje.

Pri septičnem šoku okužba povzroči:

1. vazodilatacijo,
2. povečano prepustnost kapilar,
3. uhajanje tekočine iz žilja v tkiva,
4. relativno ali absolutno hipovolemijo,
5. moteno delovanje srca,
6. slabo prekrvavitev organov.

Zato otrok razvije znake šoka: tahikardijo, slabo perfuzijo, moteno zavest, tahipnejo, zmanjšano diurezo in pozneje hipotenzijo. Pri sumu na septični šok je potreben **zgodnji širokospektralni i.v. antibiotik**, idealno po odvzemu hemokultur, vendar se z antibiotikom ne sme odlašati, če odvzem krvi zamuja. V urgentni medicini velja načelo: antibiotik čim prej, praviloma znotraj prve ure pri šoku.

Če po tekočinskih bolusih otrok ostaja v šoku – slaba perfuzija, motena zavest, tahikardija, šibki pulzi, podaljšan kapilarni povratek, laktat narašča – gre za **tekočinsko neodziven septični šok.** Takrat so potrebni **vazoaktivni/ inotropni pripravki**. Pri otrocih s šokom, ki se ne popravi po tekočinah, se uporabljata predvsem **adrenalin ali noradrenalin**,

ZAPISKI

SCENARIJ 3/07: ASMATIČNI NAPAD

Klic 112: »*Otrok, star 3 leta (14 kg), znan astmatik, nenadno poslabšanje stanja od ponoči, duši ga, ne more povezano govoriti, neješč.*«

Prvi vtis (premikanje, dihanje, barva kože): Otrok sedi, piskajoče diha z naporom, ne more povezano govoriti.

Pristop:

- **Varnost.**
- **Zavest**: odzove se na glas (V).
- **A**: dihalna pot prosta.
- **B**: dihanje 50/min (glej, poslušaj, občuti – LLF; frekvenca dihanja, dihalno delo, dihalni volumen, oksigenacija – RWTO) – simetrično dvigovanje prsnega koša, bled, brez cianoze, SaO_2 – 80 %, podaljšan ekspirij, piskajoče dihanje.
- **C**: ocena frekvence in 4P: SF – 150/min – ozki kompleksi, poten.
- **D**: ni povišane temperature, nekoliko izčrpan, GCS 12.
- **E**: ni sprememb na koži.

Ukrepi:

A – dihalna pot prosta.

B – kisik 100 % do 94–98 %, bronhodilatatorji (inhalacija ali preko bučke).
Odmerki: Ventolin: 0,03 ml/kg do max. 1 ml + 2 ml NaCl,
Berudoal 1 ml + 2 ml NaCl + 6 l O2,
Medrol – 1 mg/kg.
C – monitoring, frekvenca 150/min i.v. pot uspe, bolus tekočin 10 ml/kg = 120 ml.

Stanje se ne izboljšuje:

- $MgSO_4$ – 40 mg/kg v 10 minutah,
- Aminofilin 5 mg/kg v 20 minutah.

Otrok postaja vedno bolj izčrpan, odsoten, cianotičen in bradipnoičen, grozi dekompenzacija.

CPAP/Priprava za ETI in umetna ventilacija.

Odvzem krvi za plinsko analizo arterijske krvi (PAAK).

Priprava zdravil ob potrebi za RSI v pediatriji

Odmerki zdravil za sedacijo:

Zdravilo	Odmerek	Lastnosti
Ketamin	1–2 mg/kg i.v.	Dobro za otroke v šoku ali astmi.
Etomidat	0,2–0,4 mg/kg i.v.	Stabilen krvni tlak, manjša depresija dihanja.
Midazolam	0,1–0,2 mg/kg i.v.	Manj pogosta izbira, počasnejše delovanje.
Propofol	1–2 mg/kg i.v.	Hitro delovanje, lahko povzroči hipotenzijo.

Odmerki zdravil za mišično relaksacijo:

Zdravilo	Odmerek	Lastnosti
Sukcinilholin	1–2 mg/kg i.v.	Hitro delovanje, lahko povzroči hiperkaliemijo.
Rokuronij	0,6–1,2 mg/kg i.v.	Podaljšano delovanje, brez tveganja za hiperkaliemijo.
Vekuronij	0,1–0,2 mg/kg i.v.	Podaljšano delovanje.

Odmerki zdravil za postintubacijsko oskrbo:

Zdravilo	Odmerek	Namen
Midazolam	0,05–0,1 mg/kg/h i.v.	Sedacija.
Fentanil	1–2 mcg/kg i.v.	Analgezija.
Propofol	50–150 mcg/kg/min i.v.	Sedacija (pozor pri hipotenziji).

DISKUSIJA

Astmatični napad je akutno ali subakutno poslabšanje simptomov in pljučne funkcije glede na otrokovo običajno stanje. Pogosto ga sprožijo virusna okužba dihal, alergeni, onesnažen zrak, telesni napor ali slabo jemanje inhalacijskega kortikosteroida. Hud napad je lahko življenjsko ogrožajoč tudi pri otroku. Pri astmatičnem napadu otrok razvije bronhokonstrikcijo, edem sluznice in povečano izločanje sluzi, kar povzroči obstrukcijo izdihanega zraka, hiperinflacijo, povečano delo dihanja in hipoksemijo. Sprva je CO_2 pogosto znižan zaradi hiperventilacije, naraščanje CO_2 pa pomeni izčrpavanje in grozečo respiratorno odpoved.

Znaki:

Podaljšan izdih – sliši se piskanje, vendar pri zelo hudem napadu piskanja ni več, ker zraka skoraj ni več dovolj za nastanek zvoka.

Povečano dihalno delo – otrok uporablja pomožne dihalne mišice, vidi se ugrezanje medrebrnih prostorov, jugululma, širjenje nosnic, dvigovanje ramen.

Ventilacijsko-perfuzijsko nesorazmerje – nekateri alveoli so slabše ventilirani, kri pa še vedno teče mimo njih, zato pade saturacija kisika.

Normalen ali povišan CO_2 – pri hudem napadu je porast CO_2 znak, da otrok ne zmore več učinkovito ventilirati.

Respiratorna odpoved – če se obstrukcija nadaljuje, nastanejo hipoksemija, hiperkapnija, acidoza, motnja zavesti in lahko tudi zastoj dihanja.

Medikamentozno zdravljenje (po naročilu zdravnika)

Salbutamol (Ventolin)

Salbutamol je kratkodelujoči β_2-agonist. Veže se na β_2-receptorje v gladki mišici bronhov in povzroči **bronhodilatacijo**.

Daje se z **inhalatorjem s podaljškom** ali z nebulizatorjem. Pri otrocih je prednosten, ker je hiter, učinkovit in ima manj sistemskih stranskih učinkov kot nebulizacija. Nebulizator se uporabi, če otrok zaradi dihalne stiske ne more dobro sodelovati.

Primer zdravljenja po pediatričnih smernicah: več zaporednih odmerkov salbutamola na 20 minut v prvi uri; pri hujšem napadu lahko kontinuirana nebulizacija.

Stranski učinki salbutamola: tremor, tahikardija, nemir, hipokaliemija, hiperglikemija, laktacidoza.

Ipratropij (Berudoal)

Ipratropij je antiholinergik. Blokira muskarinske receptorje in zmanjša vagalno posredovano bronhokonstrikcijo. Doda se pri **zmernem do hudem napadu**, običajno skupaj s prvimi odmerki salbutamola. Kombinacija salbutamola in ipratropija je učinkovitejša kot salbutamol sam in zmanjša verjetnost hospitalizacije.

Sistemski kortikosteroid (deksametazon, hidrokortizon ali metilprednizolon)

Kortikosteroid ne deluje takoj kot salbutamol, vendar zmanjša vnetje, edem sluznice in nastajanje sluzi. Zato ga damo **zgodaj** pri zmernem, hudem ali življenjsko ogrožajočem napadu.

Magnezijev sulfat

Če se stanje otroka s hudim napadom po začetni intenzivni terapiji ne izboljšuje, se uporabi **magnezijev sulfat intravensko**.

Eskalacija pri življenjsko ogrožajočem napadu

Če otrok ostaja hudo prizadet, ima tih prsni koš, zmedenost, cianozo, utrujenost, nizko saturacijo ali naraščajoč CO_2, so potrebni urgentni ukrepi.

Možni ukrepi so:

- kontinuirana nebulizacija salbutamola s kisikom,
- IV salbutamol ali terbutalin,
- IM adrenalin, posebej če je možna anafilaksija ali je pretok zraka tako slab, da inhalacijska terapija ne pride učinkovito do bronhov,
- CPAP ali BiPAP pri izbranih otrocih,
- intubacija in mehanska ventilacija, če grozi ali nastopi respiratorna odpoved.

ZAPISKI

SCENARIJ 3/08: ANAFILAKSIJA

Klic 112: »*Otroka, starega 5 let, je pičilo več os, pada v nezavest, ne more dihati, ko ga je nazadnje pičila osa, je imel probleme.*«

Prvi vtis (premikanje, dihanje, barva kože): Otrok leži, obrača oči, izražen bronhospazem, po telesu generalizirana utrikarija, ustnice in obraz otečene, povedo, da mu je ušlo blato.

Pristop:

- **Varnost.**
- **Zavest**: odzove se na glas.
- **A**: dihalna pot delno zaprta, slišen stridor.
- **B**: dihanje 45/min (glej, poslušaj, občuti – LLF; frekvenca dihanja, dihalno delo, dihalni volumen, oksigenacija – RWTO) – simetrično dvigovanje prsnega koša, SaO_2 – 92 %, piskajoče dihanje obojestransko.
- **C**: ocena frekvence in 4P: SF – 150/min – ozki kompleksi, KT – 70/40 mmHg, periferni utrip šibak, centralni dobro tipen, tople okončine, kapilarna polnitev do 3 s.
- **D**: GCS – 12, odziven na V, glukoza – 6 mmol/l.
- **E**: utrikarija po koži, otekanje obraza in sluznic.

Ukrepi:

A – vzdržujmo odprto dihalno pot.

B – kisik 100 %.

C – monitoring, SF 150/min, i.v./i.o. pot, bolus tekočine 10 ml/kg, **adrenalin 0,01 mg/kg i.m.**

Zdravila drugega reda:

- Kortikosteroid: hidrokortizon – 10 mg/kg; metilprednizon – 2 mg/kg.
- Antihistaminik: 0,025 mg/kg.
- Bronhodilatator (Salbutamol/Ventolin); do 12 let 2,5 mg v obliki inhalacije; nad 12 let 5 mg v obliki inhalacije.
- Ponovna ocena ABC – v primeru, da se stanje ne izboljša, ponovimo adrenalin čez 5 minut.
- Odvzem krvi za laboratorij.
- V primeru potrebe ponavljamo bolus tekočine (kristaloidov) 10 ml/kg.

Če se dihalna stiska še poglablja, otroku pa grozi dihalni zastoj, je potrebna ETI. Če izvedba zaradi zapore dihalne poti ni mogoča, pristopimo h kirurški metodi – konikotomija.

Odmerki adrenalina (samoinjektor EPIPEN) v primeru anafilaktičnega šoka v pediatriji:

- do 6 let: 0,15 mg/i.m.,
- 6–12 let: 0,30 mg/i.m.,
- nad 12 let: 0,5 mg/i.m.

ZAPISKI

SCENARIJ 3/09: POŠKODOVAN OTROK

Klic 112: »*Otrok je padel s kolesom, krvavi, je v nezavesti.*«

Prvi vtis: Pristop je varen. Otrok, deček, star 2 leti (12 kg), leži na hrbtu, hudih krvavitev ni zaznati, deformacije okončin tudi ne. Blizu njega poganjalček, mati ga drži v naročju. Lokacija dogodka 50 minut oddaljena od najbližjega UC.

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
Varnost, oprema	Pristop s sprednje strani.	Primemo glavo in ogovorimo.	Pokličemo brez varovanja glave.
Zavest – P	Stimulacija.	Reagira z reakcijo umika.	
A – hropeče diha, nekaj krvi v ustih.	Trojni manever.	Aspiracija ustne votline.	Zapora dihalne poti.
B: FD – 30/min, avskultatorno desno slabše slišno dihanje, SaO_2 – 92 %.	Avskultacija, SaO_2 na prst.	Kisik.	SaO_2 – 80 %, pomodrelost.
C: KT – 100/65 mmHg, SF – 110/min, slišen reden ritem, EKG – sinusna tahikardija, bleda koža, kapilarna polnitev – 3 s.	Tipanje pulza radialno, koža bleda, hladna (leži zunaj).	Vodoravni položaj, pregled roke – i.v./i.o. pot – 0,9 % NaCl 500 ml.	KT – 80/40 mmHg, utrip – 65/min, slabo odziven.
ITLS pregled	Glava in vrat – kontuzijska značka desno frontalno. **Vratna opornica** Prsni koš – kontuzijska značka desno, trebuh, medenica, spodnje in zgornje okončine, pulz, gibljivost, občutljivost (PGO), stabilnost, hrbtenica – odrgnine po hrbtu.	Dihanje desno slabše slišno, perkusija – hiposonorno, tekočine bolus 10 ml/kg.	
Imobilizacija	Obračanje v osi, pregled hrbtenice.	Deska za imobilizacijo otrok, pripenjanje, zaščita glave.	
D – GCS 10, glukoza – 5,0 mmol/l			
E – afebrilen.			
SAMPLE	Povpraša starše.	S – 0, A – 0, M – 0, P – bronhitis, L – 2 uri, E – pove mati.	
Ponovna ocena ABCDE			
A – prosta.			

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
B: FD – 6/min, SaO_2 – 78 %.	Avskultacija.	Oskrba dihalne poti - I-gel št. 2, - RSI (ketanest, rocuronij.	
C: SF – 60/min, KT – 100/50 mmHg.	Merjenje KT, poslušanje srca, snemanje EKG.		
D: GCS 5, po RSI 3			
Priprava na transport in najava v sprejemni bolnišnici.			

DISKUSIJA

Obravnava poškodovanega otroka v izvenbolnišničnem okolju je ključnega pomena za zagotovitev njegove varnosti, stabilizacije in preprečitve dodatnih poškodb. Otroci imajo specifične fiziološke, anatomske in psihološke lastnosti, ki zahtevajo poseben pristop. Značilnosti obravnave poškodovanega otroka:

- Otroci hitreje izgubijo telesno toploto, zato je pomembno preprečevati podhladitev.
- Imajo večjo elastičnost tkiv, kar lahko prikrije resne poškodbe notranjih organov;
- Hitrejši srčni utrip in manjša rezerva v primeru šoka.
- Otroci so bolj dovzetni za strah in stres, pomemben je empatičen pristop, mirna komunikacija in prisotnost staršev, če je to mogoče.
- Poškodovani otrok potrebuje občutek varnosti, reševalci morajo vzpostaviti zaupen odnos.
- Zbiranje ključnih informacij za nadaljnjo oskrbo (mehanizem poškodbe, prisotnost spremljajočih bolezni, alergij).

ZAPISKI

SCENARIJ 3/10: PRIROJENA ARITMIJA

Klic 112: *»5-letni deček se je nenadoma zgrudil med prireditvijo na prostem. Po navedbah prič je otrok nenadoma prenehal odgovarjati, se sesedel in za nekaj sekund imel neobičajne trzaje v okončinah.«*

Prvi vtis (premikanje, dihanje, barva kože): nepremično leži, vidno plitvo dihanje, koža bleda.

Pristop:

- **Varnost.**
- **Zavest**: leži v bočnem položaju, neodziven, brez vidnih poškodb.
- **A**: dihalna pot v bočnem položaju odprta, ob obračanju in pregledu ustne votline nekaj sline.
- **B**: dihanje 20/min (glej, poslušaj, občuti – LLF; frekvenca dihanja, dihalno delo, dihalni volumen, oksigenacija – RWTO) – simetrično dvigovanje prsnega koša, SaO_2 – 86 %.
- **C**: ocena frekvence in 4P: SF – 50–60/min, aritmičen, EKG – ozki kompleksi, sum na podaljšan QT sindrom, KT – 73/45 mmHg, periferni utrip šibak, centralni dobro tipen, hladne okončine, kapilarna polnitev do 3 s.
- **D**: GCS – 6, odziven na P, glukoza – 8 mmol/l.
- **E**: T – 35,8 °C
- **Dodatna anamneza**: Starši poročajo o predhodni **epizodi omedlevice teden dni prej**, ki je trajala nekaj sekund, zadnje dni je bil utrujen, imel bolečine v nogah, cepljen po programu, brez alergij in kroničnih bolezni.

Ukrepi:

A – vzdrževanje proste dihalne poti z ročnim manevrom, aspiracija, dokončna oskrba z I-gel, ETI.

B – kisik 100 %.

C – monitoring, EKG, SF – 50–60/min, i.v./i.o. pot, bolus tekočine 10 ml/kg.

Med obravnavo:

C: na monitorju ritem Torsade de Pointes, pojav cianoze, vidno podihavanje, utripi niso tipni.

Ukrep: defibrilacija 4 J/kg (18 kg = 70 J); stisi prsnega koša. Če je dihalna pot oskrbljena stisi – vpihi asinhrono; če dihalna pot ni oskrbljena 15 : 2.

Po dveh minutah ocena ritma:

Na monitorju ritem združljiv z življenjem s SF 60/min, utrip tipen na a. carotis.

Ponovna ocena ABCDE:

Zavest: brez zavesti.

A – dihalna pot prosta.

B – dihanje 20/min.

C – utrip tipen na a. carotis 60/min, EKG – sinusni ritem z značilnostmi long QT intervala, občasne salve Torsade de Pointes, KT – 95/50 mmHg.

Ukrep: **Magnezij 1M 25 % raztopina** – 25–50 mg/kg i.v. = 0,5–1g (2–4 ml raztopine v 10–20 min); pripraviti po zdravnikovem naročilu.

D – AVPU: U, GCS: 3, sladkor 4,5 mmol/l.

E – temperatura 35,5 °C.

Priprava na transport v urgentni center/klic HNMP.

DISKUSIJA


Long QT sindrom je primarna električna motnja srčne repolarizacije, ki se kaže s podaljšanim QT-intervalom na EKG-ju (QTc ≥ 460 ms pri otrocih) in poveča tveganje za nastanek polimorfne VT tipa torsades de pointes in nenadno srčno smrt. Gre za kanalopatijo, kjer napaka v ionskih kanalih (najpogosteje Na^+ in K^+ kanalih) vodi v moteno repolarizacijo miokarda.

Klinična slika v pediatriji

- **Asimptomatski** (pogosto odkrit naključno pri presejanju).
- **Sinkope** med igro, plavanjem ali stresom.
- **Epileptiformne epizode** (zaradi cerebralne hipoperfuzije – pogosto napačno diagnosticirane kot epilepsija).
- **Nenadna srčna smrt** (lahko prva manifestacija).

POMEMBNO

Pri **long QT sindromu** ima dajanje **magnezija** specifično vlogo – **akutna terapija** pri nevarni aritmiji Torsade de Pointes.



Slika 11: Podaljšan QT interval pri otroku

Vir: https://litfl.com/long-qt-syndrome/



Slika 12: Polimorfna ventrikulatna tahikardija tipa Torsade de Pointes

Vir: https://litfl.com/polymorphic-vt-and-torsades-de-pointes-tdp/

ZAPISKI

PRISTOP IN OSKRBA ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA NOVOROJENČKA

Učni cilji

Po zaključku scenarija bo udeleženec zmožen:

- ☐ razdeliti ključne vloge v timu in uporabiti jasno timsko komunikacijo in komunikacijo z materjo;
- ☐ prepoznati klinično sliko in stopnjo ogroženosti novorojenčka in matere;
- ☐ izvesti oceno stanja novorojenčka po Apgarjevi lestvici in povezati vitalne znake, anamnezo in prepoznano simptomatiko;
- ☐ določiti prednostno zaporedje ukrepov ter izvesti postopke in posege v okviru kompetenc ali po naročilu zdravnika;
- ☐ zagotoviti kontinuiran monitoring, najavo v porodnišnici in strukturirano predajo matere in novorojenčka.

Strokovna priporočila in smernice

Scenariji se nanašajo na priporočila Evropskega reanimacijskega sveta za novorojenčke NILS 2025 (ang. European Pediatric Life Support).

Splošna vprašanja ob koncu vsakega scenarija

- Kateri podatki so vas najprej usmerili k pravilni prepoznavi kliničnega problema v scenariju?
- Kateri ukrep je bil v prvih minutah časovno najbolj kritičen in zakaj ste ga izvedli v izbranem zaporedju?
- Kje v tem scenariju bi lahko nastala najpomembnejša varnostna napaka in kako bi jo preprečili?
- Kako je potekala razdelitev vlog, komunikacija znotraj tima in predaja informacij ter kaj bi ob ponovitvi scenarija izvedli drugače?

SCENARIJ 4/01: DONOŠEN NOVOROJENČEK (ASFIKSIJA S POPKOVNICO)

Klic 112: *»Porod v 39. tednu, otrok porojen z ovito popkovnico okoli vratu. Popkovnica je bila uspešno odstranjena. Porodna teža 3200 g.«*

Stanje novorojenčka:

Tonus: negiben, mlahav.

Barva kože: centralna cianoza.

Dihanje: podihuje.

Ukrepi:

1. Zgodnja razrešitev/prekinitev popkovnice.
2. Namestitev novorojenčka na suho in toplo podlago.
3. Stimulacija, sušenje, brisanje, pokrivanje, kapica.
4. APGAR po 1. minuti – 3.
5. Sprostitev dihalne poti, podlaganje lopatic, ocena dihanja in cirkulacije – agonalno dihanje, utrip – 80/min.
6. Inflacijski vpihi – 5 x z zrakom (2–3 s), inflacijski tlak 30 cm H_20.
7. Prsni koš se dviga, gasping, SF – 80/min/oksimeter preduktalno.
8. Umetna ventilacija 3 x 5 vpihov v 30 sekundah (1 s vpih – 1 s izdih).
9. Ocena ABC.
10. Agonalno dihanje, cianoza, SF – 50/min, SaO_2 nemerljiv.
11. Stisi prsnega koša, umetna ventilacija s 100 % kisik (3 : 1) – 30 s.
12. Medtem: Priprava na dokončno oskrbo dihalne poti (ETI, I-gel), aspiracija pp. Millerjeva lopatka 0.
13. Kontrola lege tubusa (št. 3), prsni koš se dviguje, SF – 50/min, $ETCO_2$ – 25 mmHg.
14. Monitoring, priprava venskega, umbilikalnega/i.o/I.T. dostopa, priprava adrenalina (0,01mg /kg i.v; 0,05–0,1 mg/kg i.t) in aplikacija, če po 30 sekundah stisov ni izboljšanja.
15. Aplikacija tekočine 10 ml/kg (5–10 min).
16. Po 60 sekundah oživljanja utrip 140/min, barva rožnata.
17. Poreanimacijska oskrba in priprava na transport – neonatalni oddelek.

DISKUSIJA

Naveden je primer poroda novorojenčka s porodno asfiksijo. Ob porajanju glavice preverimo lego popkovnice na vratu, razrešimo jo z ročno manipulacijo/zgodnjo prekinitvijo. Če je dihalna pot prosta, je ventilacija ustrezna z ročnim dihalnim balonom, ETI nima prioritete. Transport se izvede na neonatalni oddelek, idealno UKC MB/LJ. Trenutno ni na voljo helikopterja z inkubatorjem, le zemeljske ekipe. Poreanimacijska oskrba: nadzor ABC, stalen monitoring, vzdrževanje oksimetrije do 95 %, temperature in kontrola glukoze.

SCENARIJ 4/02: NOVOROJENČEK (PREZGODNJI POROD – NEDONOŠENČEK)

Klic 112: *»Porod doma v 28. tednu nosečnosti. Porodna teža približno 1000 g. Doma so se pojavili nenadni popadki, ko je mati zdrsnila in padla po stopnicah.«*

Nedonošenček se rodi v jajčnem ovoju.

Stanje nedonošenčka:

Tonus: negiben, mlahav, brez znakov življenja.

Barva kože: bled.

Dihanje: ni zaznanega dihanja ali joka.

Ukrepi:

1. Zgodnja razrešitev/prekinitev popkovnice, če otroka premeščamo na drugo podlago.
2. Namestitev nedonošenčka na toplo podlago.
3. Stimulacija hrbta in podplatov, ovijanje mokrega v kuhinjsko folijo ali astrofolijo, pokrivanje glavice.
4. APGAR po 1. minuti – 3.
5. Sprostitev dihalne poti, ocena dihanja in cirkulacije – odsotno dihanje, SF – 70/min.
6. Inflacijski vpihi – 5 x z zrakom (2–3 s), inflacijski tlak 25 cm H_2O.
7. Prsni koš se dviga, utrip 70/min.
8. Umetna ventilacija 3 x 5 v 30 sekundah, dodatek kisika z nizkim pretokom (21–30 %).
9. Ocena ABC, APGAR – 6.
10. Dihanje 10/min, periferna cianoza, SF – 80/min.
11. Nadaljevanje umetne ventilacije 30/min/ 15x v 30 sekundah.
12. Po 30 sekundah ocena.
13. Dihanje 30/min, periferna cianoza, SF – 150/min.
14. Ocena APGAR – 7 (grimase, periferna cianoza, okončine v fleksiji).
15. Nadaljnja oskrba nedonošenčka – ocena ABCDE, ogrevanje, najava v porodnišnico.

DISKUSIJA

V reanimaciji govorimo o nedonošenčku pri manj kot 32 tednih gestacijske starosti. Otroka rešimo iz jajčnega ovoja, ga ogrevamo, izvedemo stimulacijo in zavijemo v plastično folijo (v NMP astrofolijo). Pred prekinitvijo popkovnice izvedemo molzenje v smeri otroka. Pazimo na zadostnost dihanja, nedonošenček ima še nerazvita pljuča – sicer ventilacijska podpora. Transport na neonatalni oddelek, inkubator zagotavlja zemeljska ekipa UKC Ljubljana.

ZAPISKI

SCENARIJ 4/03: NOVOROJENČEK (ASPIRACIJA MEKONIJSKE PLODOVNICE)

Klic 112: »*Porod v 40. tednu nosečnosti, ob rojstvu mekonijska plodovnica. Porodna teža 3500 g.*«

Stanje novorojenčka:

Tonus: negiben, mlahav, brez znakov življenja.

Barva kože: ciaontičen.

Dihanje: ni zaznanega dihanja ali joka.

Ukrepi:

1. Zgodnja razrešitev/prekinitev popkovnice, če bi ta ovirala oskrbo.
2. Namestitev novorojenčka na suho in toplo podlago.
3. Stimulacija hrbta in podplatov, sušenje, brisanje, pokrivanje, kapica.
4. APGAR po 1. minuti – 3.
5. Sprostitev dihalne poti – nevtralni položaj, podlaganje lopatic, ocena dihanja in cirkulacije – dihanje odsotno, SF – 80/min.
6. Inflacijski vpihi – poskus 5 x z zrakom (2–3s), prsni koš se ne dviga, izhajanje mekonijske plodovnice iz dihal.
7. Aspiracija skozi nos, ponovni poizkus ventilacije, izhajanje obilo aspirata – plodovnice.
8. Ponovni poizkus ventilacije 5 x z zrakom, prsni koš se slabo dviga.
9. Odločitev za ETI, tubus št. 3,0, lopatka 0, kontrola lege tubusa (št. 3), aspiracija, prsni koš se dviguje, SF – 50/min, ETCO2 – 30 mmHg, SaO_2.
10. Ponovni poizkus ventilacije 5 x z zrakom, prsni koš se dvigne.
11. Dihanje je odsotno, SF – 70/min.
12. Umetna ventilacija z zrakom 3 x 5 v 30 sekundah
13. Ocena ABC, APGAR (3).
14. Agonalno dihanje, cianoza, SF – 50/min.
15. Stisi prsnega koša, umetna ventilacija s 100 % kisik (3 : 1).
16. Po 30 sekundah ponovna ocena ABC – brez dihanja, SF – 80.
17. Nadaljevanje umetne ventilacije 30/min, monitoring, priprava venskega/i.o./I.T. dostopa, SaO_2 – 75 %.
18. Po 30 sekundah ventilacije ocena SF – 130/min, umetna ventilacija 30/min, otrok neodziven.
19. Poreanimacijska oskrba in priprava na transport – najava na neonatalni oddelek.

DISKUSIJA

Aspiracija mekonijske plodovnice pomeni, da novorojenček pred porodom, med porodom ali takoj po rojstvu vdihne plodovnico, onesnaženo z mekonijem. Če ima otrok nato znake dihalne stiske, govorimo o **sindromu aspiracije mekonija**. Najpogosteje gre za donošenega ali prenošenega novorojenčka. Mekonij lahko:

- povzroči mehansko obstrukcijo dihalnih poti in lahko delno ali popolnoma zapre bronhije;
- draži pljučno tkivo in sproži vnetni odgovor, nastaneta edem in poškodba alveolokapilarne membrane;
- zmanjša delovanje surfaktanta, zato alveoli kolabirajo, zmanjša se komplianca pljuč in poveča delo dihanja;

– povzroči perzistentno pljučno hipertenzijo novorojenčka z desno-levim šantom skozi ductus arteriosus ali foramen ovale povzroči hudo hipoksemijo.

Prisotnost mekonijske plodovnice pomeni, da mora biti ob porodu prisotna ekipa, ki zna izvajati **popolno neonatalno reanimacijo**, vključno z ventilacijo, intubacijo in oskrbo dihalne poti. Novorojenčka ne aspiriramo rutinsko, tudi če je nevitalen. Če je vitalen, izvedemo standardno oskrbo in opazovanje. Če je nevitalen, ga ogrejemo, osušimo, stimuliramo, oskrbimo dihalno pot in ob apneji, podihavanju ter frekvenci srca pod 100/min takoj začnemo z ventilacijo s pozitivnim tlakom.

ZAPISKI

SCENARIJ 4/04: NOVOROJENČEK (ABRUPCIJA PLACENTE)

Klic 112: »*Porod v 35. tednu, porodna teža 2500 g.*«

Stanje novorojenčka:

Tonus: negiben, mlahav, brez znakov življenja.

Barva kože: bled in ciaontičen.

Dihanje: ni zaznanega dihanja ali joka.

Ukrepi:

1. Zgodnja razrešitev/prekinitev popkovnice, če ta ovira oskrbo.
2. Namestitev novorojenčka na suho in toplo podlago.
3. Stimulacija hrbta in podplatov, sušenje, brisanje, pokrivanje, kapica.
4. APGAR po 1. minuti – 3.
5. Sprostitev dihalne poti – nevtralni položaj, podlaganje lopatic, ocena dihanja in cirkulacije – dihanje odsotno, srčni utripi odsotni.
6. Inflacijski vpihi – poskus 5 x z zrakom (2–3 s), prsni koš se dviga.
7. Ponovni poizkus ventilacije 5 x z zrakom – 30 s, brez izboljšanja.
8. Stisi prsnega koša, umetna ventilacija s 100 % kisik (3 : 1), monitoring, SaO_2 – 30 s.
9. Po 30 sekundah ponovna ocena AB – brez dihanja, brez utripov.
10. Priprava venskega, umbilikalnega/i.o/i.t. dostopa.
11. Priprava adrenalina (0,01mg /kg i.v.; 0,05–0,1 mg/kg i.t.) in aplikacija.
12. Aplikacija tekočine 10 ml/kg (5–10 min).
13. Po 30 sekundah ponovna ocena AB – brez dihanja, utrip 30/min.
14. Nadaljevanje TPO 3 : 1, po 4 minutah brez dihanja, bradikardija 30/min.
15. Priprava adrenalina (0,01mg /kg i.v; 0,05–0,1 mg/kg i.t.) in aplikacija, če frekvenca srca ni višja od 60/min.
16. Aplikacija tekočine 10 ml/kg (5–10 min).
17. Po 30 sekundah ocena AB – agonalno dihanje, SF – 80/min.
18. Nadaljevanje umetne ventilacije 30/min.
19. Po 30 sekundah ventilacije SF – 120/min.
20. Poreanimacijska oskrba in priprava na transport – neonatalni oddelek.

DISKUSIJA

Abrupcija placente (odstop posteljice) je nujno medicinsko stanje, ki zahteva takojšnje ukrepanje. Obsežnost in vrsta ukrepov pri materi in novorojenčku sta odvisni od resnosti odstopa placente, stanja matere in ploda ter trajanja nosečnosti.

Oskrba šokiranega novorojenčka – oskrba usmerjena v zgodnjo razširitev pljuč, poskusimo z umetno ventilacijo nato s postopki oživljanja, ETI nima prioritete, ima pa prioriteto i.o./umbilikalna pot za nadomeščanje tekočin, cilj je čim prej transport in transfuzija.

Oskrba matere: Spremljanje vitalnih znakov - krvnega tlaka, srčnega utripa, saturacije kisika. Hitro vzpostavitev intravenske poti za nadomeščanje tekočin in/ali transfuzijo krvi. Če je stanje kritično se izvede urgentni carski rez. Pri porodu po naravni poti je potrebno ustavljati krvavitev pri materi z uterotonikom (oksitocin) in masažo maternice.

ZAPISKI

SCENARIJ 4/05: POROD (NEPRAVILNA VSTAVA PLODA)

Klic 112: »*Gospa, stara 40 let, ima popadke, 3. porod, rojeva, nogice so vidne, medenična vstava, 40. teden nosečnosti.*«

Prvi vtis: Gospa leži na kavču, otrok je porojen z nogicami in ritko naprej, zastoj na nivoju ramen.

Vitalni znaki ABCDE	Pristop	Ukrepi	Neustreznem pristop
Varnost, oprema	Pristop k nogam matere.	Pripravimo porodni set in opremo.	Zastoj poroda.
Reševanje nog	Otroka primemo z objemom za medenico (levo desno).	Naredimo rahlo rotacijo levo desno, poizkušamo izvleči eno in drugo nogo.	Zastoj poroda.
C - Preverjanje utripa na popkovnici	Poiščemo potek popkovnice.	Otipamo utrip SF – 80/min	
Reševanje ramen	Primemo za področje križnice.	Rešujemo roke s poizkusom izvleka.	
Reševanje glavice	Ena roka na spodnji del trupa, druga na hrbet.	Manever s počasnim dvigom navzgor.	
A – plodovnica v ustih	Čiščenje.	Aspiracija nosno - ustne votline.	Zapora dihalne poti.
B: 0/min, avskultatorno neslišno dihanje	Nevtralni položaj (LLF).	Stimulacija: brisanje, drgnjenje, ogrevanje.	
B – otrok ne zadiha	Umetna ventilacija z dihalnim balonom 280 ml.	5 vpihov z zrakom na 2–3 s	
C – kontrola cirkulacije	Tipanje utripa.	SF – 80/min	
B – otrok ne zadiha	Umetna ventilacija z dihalnim balonom 280 ml.	5 vpihov z zrakom na 2–3 s	
Merjenje oksimetrije	Oksimeter na desno okončino – preduktalno.	80 % (v tretji minuti).	
C: F: 50/min bleda koža	Če SF pod 60/min stisi prsnega koša.	**Razmerje 3 : 1**	
TPO	Dva izvajalca, monitoring, saturacija, ETI – CRASH.		
Po 5 min TPO			
A – dihalna pot	Oskrba z ETI.		
B - dihanje	Umetna ventilacija.	FD – 40/min	
C - cirkulacija	Monitoring, tipni centralni pulzi.	SF – 160/min	

DISKUSIJA

Porod pri medenični vstavi (ko je otrok obrnjen z zadnjico ali stopali proti porodnemu kanalu) predstavlja poseben izziv. Vodenje takšnega poroda je odvisno od vrste medenične vstave, stanja matere in ploda ter usposobljenosti porodničarskega osebja.

Vrste medenične vstave:

1. Popolna medenična vstava: plod je v sedečem položaju z nogami pokrčenimi v kolenih.
2. Nepopolna medenična vstava (zadnjična vstava): plod je z zadnjico najbližje porodnemu kanalu, noge so iztegnjene navzgor.
3. Stopalčna vstava: eno ali obe stopali sta najbližje porodnemu kanalu.

Možni zapleti pri medenični vstavi:

1. Zastoj poroda: glava ploda lahko obtiči, saj je največji del telesa.
2. Hipoksija: stiskanje popkovine med porodom lahko zmanjša dotok kisika.
3. Poškodbe ploda: možnost poškodb vratu, hrbtenice ali glave.
4. Porodne poškodbe matere: večje tveganje za poškodbe porodnega kanala in nastanek krvavitev.

ZAPISKI

SCENARIJI TEMELJNIH IN NAPREDNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

SCENARIJI TEMELJNIH IN NAPREDNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA PRI ODRASLI OSEBI

Učni cilji

Po zaključku scenarija bo udeleženec zmožen:

- ☐ razdeliti ključne vloge v timu in uporabiti jasno timsko komunikacijo;
- ☐ prepoznati klinično sliko in stopnjo ogroženosti pacienta;
- ☐ izvesti oceno stanja pacienta, pri tem uporabiti strukturiran pristop ABCDE in povezati vitalne znake, anamnezo in prepoznano simptomatiko;
- ☐ določiti prednostno zaporedje ukrepov ter izvesti postopke in posege v okviru kompetenc ali po naročilu zdravnika;
- ☐ zagotoviti kontinuiran monitoring, najavo sprejemni ustanovi in strukturirano predajo pacienta.

Strokovna priporočila in smernice

Scenariji se nanašajo na priporočila Evropskega reanimacijskega sveta za odrasle ALS 2025 (ang. Adult Advanced Life Support).

Splošna vprašanja ob koncu vsakega scenarija

- Kateri podatki so vas najprej usmerili k pravilni prepoznavi kliničnega problema v scenariju?
- Kateri ukrep je bil v prvih minutah časovno najbolj kritičen in zakaj ste ga izvedli v izbranem zaporedju?
- Kje v tem scenariju bi lahko nastala najpomembnejša varnostna napaka in kako bi jo preprečili?
- Kako je potekala razdelitev vlog, komunikacija znotraj tima in predaja informacij ter kaj bi ob ponovitvi scenarija izvedli drugače?

SCENARIJ TPO 5/01: KRVAVITEV IZ ČREVESJA

Naročilo reševalnega prevoza: »*Naročamo reševalni prevoz za pacienta v DSO Rogaška Slatina k internistu, ker se stanovalec slabo počuti*«.

Prvi vtis: Gospod, star 78 let, leži v postelji z dvignjenim vzglavjem, ker menda težje diha. Gospod je bled in hitro diha.

Pristop:

Varnost	**Varno, v domačem okolju.**
Zavest	Odziven na glas.
A	Dihalna pot odprta.
B	Dihanje 30/min, SaO_2 – 90 %.
C	Frekvenca srca 140/min, KT – 90/50, periferni utrip slabo tipen, centralni dobro tipen, hladne okončine, kapilarna polnitev do 4 s.
D	Odziven na V, glukoza – 8 mmol/l.
E	Ob pregledu najdemo svežo krvavitev iz črevesja.

Ukrepi:

1. Gospoda poležemo.
2. Apliciramo O_2 – 100 % preko maske z rezervoarjem.
3. Nastavitev proste i.v. poti.
4. Med nastavljanjem i.v. poti gospod izgubi zavest. Ocena ABC: ni odziven, zaznano agonalno dihanje, centralni utrip ni tipen.
5. Pričnemo s stisi prsnega koša in umetno ventilacijo 30 : 2.
6. Aktiviramo VUZ z zdravnikom.
7. Namestimo AED elektrode.
8. Analiza ne zahteva proženje šoka.
9. Če smo kompetentni – adrenalin 1mg.
10. Nadaljujemo TPO.
11. Razmišljamo 4H/4T.
12. Apliciramo bolus tekočin 0,9 % NaCl 500 ml.
13. Po 2 minutah analiza – šok priporočen.
14. Varnost, odmik, kisik, odmik – šok prožen.
15. Nadaljujemo TPO – 2 minuti.
16. Dihalna pot: če smo kompetentni, vstavimo I-gel.
17. Ventilacija neodvisno od stisov prsnega koša.
18. Po 2 minutah analiza – šok ni priporočen.
19. Utrip tipen na a. carotis.
20. Nadaljujemo z umetno ventilacijo 10–12/min + pretok kisika 15 l/min.
21. Nadzor pacienta.
22. Predaja ekipi z zdravnikom.

SCENARIJ TPO 5/02: MOTNJA SRČNEGA RITMA MED REKREACIJO

Klic 112: *»Moškega srednjih let je na teniškem igrišču obšla slabost.«*

Prvi vtis: Gospod, star 45 let, sedi na klopi ob igrišču, je vidno bled in prestrašen.

Pristop:

Varnost	**Varno, športno igrišče.**
Zavest	Odziven na glas.
A	Dihalna pot odprta.
B	Dihanje 24/min, SaO_2 – 99 %.
C	Frekvenca srca 50/min, KT – 100/50 mmHg, periferni utrip tipen, EKG – AMI spodnje stene in desnega prekata (pošljemo zdravniku v pregled).
D	Odziven na A, glukoza – 5,0 mmol/l.
E	Temperatura 35,6 °C.

Ukrepi:

1. Gospoda namestimo v pol sedeči položaj.
2. Nastavitev proste i.v. poti, prvi poskus ne uspe, drugi uspe, tekočine do 500 ml 0,9 % NaCl.
3. Med nameščanjem EKG elektrod gospod dobi hipoksične krče.
4. Ocena ABC: ni odziven, zaznano agonalno dihanje, centralni utrip ni tipen.
5. Pričnemo s stisi prsnega koša in umetno ventilacijo 30 : 2.
6. Aktiviramo VUZ z zdravnikom.
7. Namestimo AED elektrode/namestimo elektrode defibrilatorja.
8. **Na monitorju VF, potreba po defibrilaciji**.
9. Izvedba defibrilacije 150–200 J **(1)**.
10. Nadaljujemo 2 minuti TPO – izvajanje stisov prsnega koša in umetne ventilacije z dihalnim balonom ter dodanim kisikom.
11. Dihalna pot: če smo kompetentni, vstavimo I-gel/izvedba ETI.
12. Merjenje kapnometrije/kapnografije – 30 mmHg.
13. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – VF**.
14. Izvedba defibrilacije 300 J **(2)**.
15. TPO – neodvisno stisi 100–120/min; ventilacija 10/min.
16. Razmišljamo 4H/4T (trombembolija koronarne arterije).
17. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – VF**.
18. Izvedba defibrilacije 360 J **(3)**.
19. TPO – neodvisno stisi 100–120/min; ventilacija 10/min.
20. Če smo kompetentni – adrenalin 1mg/amiodarone 300 mg.
21. Nadaljujemo TPO.
22. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – bradikarden ritem združljiv z življenjem.**

23. Tipanje utripa na a. carotis – utripi tipni.
24. Ocena dihanja – pacient prične učinkovito dihati.
25. Odločitev za odstranitev I-gel/ ET tubusa ali sedacija in relaksacija.
26. Ustrezen položaj in nadzor pacienta.
27. Predaja ekipi z zdravnikom in klic katetrskega laboratorija.

DISKUSIJA

Pri nenadnem kolapsu med rekreacijo je osnovno pravilo, da če se oseba nenadoma zruši in ostane neodzivna, jo obravnavamo kot srčni zastoj, dokler se ne dokaže drugače. Pri športu je prepoznava lahko težja, ker ima lahko oseba na začetku še odprte oči ali kratke, krčem podobne gibe, hrope, stoka ali pa so vidni skoraj normalni dihalni gibi. To so pogosti razlogi za napačno razlago, kot je epileptični napad, sinkopa, poškodba ali izčrpanost. Neposredni razlog srčnega zastoja je najpogosteje **maligna aritmija**, predvsem VF ali VT brez tipnega utripa. Prvi ukrep je takojšen pričetek oživljanja in **defibrilacija**.

ZAPISKI

SCENARIJ TPO 5/03: UTOPLJENEC

Klic 112: *»Starejšo žensko so izvlekli iz bazena, z glavo naj bi bila že pod vodo.«*

Prvi vtis: Gospa, stara 70 let, leži ob robu bazena v bočnem položaju.

Pristop:


Varnost	**Gospa izvlečena iz vode, leži ob bazenu.**
Zavest	Se ne odzove na tresenje in klicanje.
A	V ustih nekaj tekočine – aspiracija.
B	Dihanje ni prisotno.
C	Centralni utrip ni tipen.
Med oskrbo	
D	Zenici široki, nereaktivni, glukoza – 10,0 mmol/l.
E	Temperatura 35,0 °C.

Ukrepi:

1. Aktiviramo reanimacijski team/NMP.
2. Gospo namestimo v hrbtni položaj, napravimo 5 učinkovitih vpihov z dihalnim balonom, ni izboljšanja.
3. Pričnemo s stisi prsnega koša in umetno ventilacijo 30 : 2.
4. Pobrišemo površino prsnega koša in namestimo AED elektrode; namestimo elektrode defibrilatorja.
5. **Na monitorju asistolija**.
6. Vzpostavitev proste venske poti, uporaba 500 ml 0,9 % NaCl.
7. **Aplikacija adrenalina 1 mg i.v**.
8. Nadaljujemo 2 minuti TPO – izvajanje stisov prsnega koša in umetne ventilacije z dihalnim balonom ter dodanim kisikom.
9. Dihalna pot: če smo kompetentni, vstavimo I-gel/izvedba ETI.
10. Merjenje kapnometrije/kapnografije – 25 mmHg.
11. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – asistoljia**.
12. TPO – neodvisno stisi 100–120/min; ventilacija 10/min.
13. Razmišljamo 4H/4T (hipoksija).
14. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – bradikarden ritem 45/min, (PEA)**.
15. **Aplikacija adrenalina 1 mg i.v.**
16. TPO – neodvisno stisi 100–120/min; ventilacija 10/min.
17. Nadaljujemo TPO.
18. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – bradikarden ritem združljiv z življenjem**.
19. Tipanje utripa na a. carotis – utripi tipni – prekinitev stisov prsnega koša.
20. Ocena dihanja – ne diha.
21. Umetna ventilacija preko I-gel/ETI.
22. Snemanje EKG – sinusna bradikardija 50/min z občasnimi VES.

23. Ustrezen položaj in nadzor pacienta.

24. Predaja ekipi z zdravnikom.



Slika 11: EKG zapis – sinusna bradikardija z občasnimi ekstrasistolami

Vir: https://stock.adobe.com/jp/images/ecg-pvc-premature-ventricular-contractions-ecg-ves-ventricular-extrasystoles-12-leads-ecg-paper/554681457

DISKUSIJA

Posebnosti pri oživljanju utopljenca: Zagotovimo varno reševanje utopljenca iz vode. Utopljenca izvlečemo na suho izven vode in ga položimo na hrbet. Če oseba ne kaže znakov življenja, damo 5 začetnih umetnih vpihov. Ob uporabi defibrilatorja in pred lepljenjem defibrilacijskih elektrod obrišemo površino prsnega koša. Zgodaj oskrbimo dihalno pot z I-gel /ETI, dodajajmo visoke koncentracije kisika. Ob umetni ventilaciji uporabljamo pozitivni tlak (PEEP 5–10 cm). Zaradi napolnjenosti želodca s tekočino je potrebno uvesti nazogastrično sondo. Hipotermijo preprečujemo s pokrivanjem z zlato-srebrno folijo ali premeščanjem v topel prostor in aktivnim ogrevanjem.

ZAPISKI

SCENARIJ TPO 5/04: POŠKODOVANEC

Klic 112: *»Gospo je na prehodu za pešce zbil osebni avto, leži negibno na tleh v mlaki krvi.«*

Prvi vtis: Gospa, stara 60 let, leži na cestišču, okoli glave je mlaka krvi.

Pristop:

Varnost	**Gospa leži na cestišču, policija zavaruje mesto dogodka.**
Zavest	Pristop od spredaj – se ne odzove na bolečinski dražljaj, se ne odzove na tresenje in klicanje.
A	V ustih nekaj krvi – aspiracija, izvedba trojnega manevra, varovanje vratne hrbtenice.
B	Dihanje ni prisotno.
C	Centralni utrip ni tipen, na glavi večja raztrganina z aktivno krvavitvijo.
Med oskrbo	
D	Zenici široki, nereaktivni, glukoza – 4,5 mmol/l; po oskrbi leva zenica širša.
E	Temperatura 36,0 °C.

Ukrepi:

1. Aktiviramo reanimacijski team/NMP.
2. Pričnemo s stisi prsnega koša in umetno ventilacijo 30 : 2, veliko rano na glavi oskrbimo s kompresijskim povojem.
3. Namestimo AED elektrode; namestimo elektrode defibrilatorja.
4. **Na monitorju PEA**.
5. Vzpostavitev proste venske poti, uporaba 500 ml 0,9 % NaCl.
6. **Aplikacija adrenalina 1 mg i.v**.
7. Nadaljujemo 2 minuti TPO – izvajanje stisov prsnega koša in umetne ventilacije z dihalnim balonom ter dodanim kisikom.
8. Dihalna pot: če smo kompetentni, vstavimo I-gel/izvedba ETI ob varovanju vratne hrbtenice.
9. Dihanje levo slabše slišno – perkusija hiposonorna (možen levostranski hematotoraks).
10. Merjenje kapnometrije/kapnografije – 30 mmHg.
11. **Vzpostavitev dodatne i.v. poti**.
12. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – PEA**.
13. TPO – neodvisno stisi 100–120/min; ventilacija 10/min.
14. Razmišljamo 4H/4T (hipoksija, hipovolemija).
15. Namestimo vratno opornico.
16. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – (PEA)**.
17. **Aplikacija adrenalina 1 mg i.v**.
18. TPO – neodvisno stisi 100–120/min; ventilacija 10/min.
19. Nadaljujemo TPO.
20. Po 2 minutah analiza srčnega ritma – ritem združljiv z življenjem SF – 90/min, ozki QRS.
21. Tipanje utripa na a. carotis – utripi tipni – prekinitev stisov prsnega koša.
22. Ocena dihanja – ne diha.

23. Umetna ventilacija preko I-gel/ETI.
24. Snemanje EKG – sinusni ritem SF – 90/min; KT – 130/90.
25. Priprava na transport, namestitev na zajemalna nosila z zajemanjem, monitoring, ITLS pregled.
26. Uporaba traneksamične kisline 1000 mg.
27. Predaja ekipi z zdravnikom.

DISKUSIJA

Glavni razlogi za srčni zastoj pri poškodovancih so: hipoksija, hipovolemija, tenzijski pneumotoraks in tamponada srca. Ukrepi so usmerjeni k zgodnji zaustavitvi nekontroliranih krvavitev, zagotavljanju proste dihalne poti, zadostni ventilaciji in oksigenaciji, izvedbi dekompresije prsnega koša, nadomeščanju tekočin (20 ml/kg). Običajno so pri poškodovancih prisotni ritmi, ki ne potrebujejo defibrilacije, razen pri topih udarcih prsnega koša, ki lahko sprožijo tudi letalno motnjo srčnega ritma (VTp/VF). Če vzpostavimo spontano cirkulacijo, moramo zagotoviti čim hitrejši transport.

ZAPISKI

SCENARIJ TPO 5/05: ANAFILAKSIJA

Klic 112: »*25-letni fant težko diha, zaradi rane na stopalu (stopil je na žebelj) je zaužil predpisan antibiotik.*«

Prvi vtis: Fant leži na tleh, menda je »padel skupaj« malo pred prihodom ekipe NMP.

Pristop:

Varnost	**Oseba leži v kuhinji na tleh, varnost je zagotovljena.**
Zavest	Komaj odziven – V.
A	Dihalna pot odprta.
B	Dihanje 28/min, SaO_2 – nemerljiva, slab signal, na pljučih slišno piskanje.
C	Frekvenca srca 140/min, sinus tahikardija, KT – 60/(?), periferni utrip ni tipen, centralni tipen, kapilarna polnitev do 5 s.
D	Komaj odziven na V, glukoza – 8 mmol/l, zenici enako široki, reaktivni.
E	Osip utrikarije po telesu, oteklina vek in ustnic.

Ukrepi:

1. Apliciramo O_2 – 100 % preko maske z rezervoarjem.
2. Ležeč položaj.
3. Nastavimo i.v. pot.
4. Pripravimo 0,5 mg adrenalina i.m.
5. Nadomeščanje tekočin 0,9 % NaCl 500 ml bolus.
6. Pacient izgubi zavest.
7. Ocena ABC: ni odziven, zaznano agonalno dihanje, centralni utrip ni tipen. Pričnemo s stisi prsnega koša in umetno ventilacijo 30 : 2.
8. Aktiviramo VUZ z zdravnikom.
9. Namestimo AED elektrode/ klasičen defibrilator – na monitorju PEA.
10. Če smo kompetentni – adrenalin 1mg i.v.
11. Nadaljujemo TPO.
12. Oskrba dihalne poti – I-gel, stisi/vpihi asinhrono, dodatek kisika pretok 15l/min.
13. Razmišljamo 4H/4T (hipovolemija, hipoksija).
14. **Po 2 minutah** analiza – PEA (ni znakov življenja).
15. Nadaljujemo TPO – **2 minuti – PEA** (ni znakov življenja).
16. Adrenalin **1 mg i.v**.
17. Nadaljujemo 2 minnuti TPO.
18. Po 2 minutah **VF** – priprava na **defibrilacijo 200 J**.
19. TPO – 2 minuti.
20. Aplikacija **adrenalina 1 mg i.v**.
21. Na monitorju EKG sinusna tahikardija SF – 110/min.

22. Utrip tipen na a. carotis, dihanje odsotno, KT – 100/50 mmHg, zenici enako široki reaktivni, glukoza – 5,0 mmol/l, GCS – 3.
23. Nadaljujemo z umetno ventilacijo 12/min, z dodatkom kisika do dosežene oksimetrije 94–98 %.
24. Poreanimacijska oskrba in priprava na transport, najava v bolnišnico.

ZAPISKI

SCENARIJ TPO 5/06: UTOPLJENEC

Klic 112: *»Na bližnjem jezeru naj bi se med plavanjem utopil moški, reševanje je v teku.«*

Prvi vtis: Moški, star 60 let, leži ob robu nabrežja, očividci ga imajo na boku, ker naj bi menda še nekaj dihal.

Pristop:

Varnost	**Varnost zagotovljena, osebo so že izvlekli iz vode na obrežje jezera.**
Zavest	Neodziven – U.
A	Dihalna pot – nekaj tekočine v ustih, sled krvi zaradi rane sluznice, ker so mu očividci vlekli ven jezik.
B	Dihanje 4/min, SaO_2 – nemerljiva, hladne in mokre okončine.
C	Brez tipnih pulzov na centralnih arterijah, koža hladna.
Med oskrbo	
D	GCS 3, glukoza 9,0 mmol/l.
E	Brez znakov poškodb.

Ukrepi:

1. Ni mehanizma za generalizirano poškodbo, obrat na hrbet, rahlo tresenje in klicanje.
2. Zvračanje glave, ustne votline, aspiracija.
3. Izvedemo 5 začetnih vpihov – ni odziva.
4. Tipamo pulz na a. carotis – brez tipnega utripa.
5. Pričnemo s stisi prsnega koša in umetno ventilacijo 30 : 2.
6. Aktiviramo VUZ z zdravnikom.
7. Obrišemo prsni koš.
8. Namestimo AED elektrode/ če klasičen defibrilator – na monitorju ritem asistolija – električni sunek ni potreben.
9. Če smo kompetentni – adrenalin 1mg i.v.
10. Nadaljujemo TPO.
11. Oskrba dihalne poti – I-GEL, stisi 100/min – vpihi 10/min, z dodatkom kisika asinhrono.
12. Razmišljamo 4H/4T (hipoksija, hipotermija).
13. **Po 2 minutah** analiza – ritem brez šoka – asistolija (ni znakov življenja).
14. Nadaljujemo TPO – **2 minuti – ritem brez šoka (PEA sinus bradikardija 50/min)**.
15. Adrenalin **1 mg i.v**.
16. Nadaljujemo 2 minuti TPO
17. Analiza: šok ni potreben, na monitorju sinusna tahikardija 110/min.
18. Utrip tipen na a. carotis, dihanje odsotno, KT – 100/50 mmHg, zenici enako široki, reaktivni, glukoza – 8,0 mmol/l, GCS – 3, temperatura 35 °C.
19. Nadaljujemo z umetno ventilacijo 12/min, z dodatkom kisika do dosežene oksimetrije 94–98 %.
20. Poreanimacijska oskrba, zaščita pred podhladitvijo in priprava na transport, najava v bolnišnico.
21. SAMPLE

SCENARIJ TPO 5/07: POŠKODBA Z ELEKTRIČNIM TOKOM (VISOKA NAPETOST)

Klic 112: *»Na bližnji železniški postaji naj bi enega od delavcev poškodoval električni tok.«*

Prvi vtis: Moški, star 40 let, leži ob delovnem stroju ob železniških tirih.

Pristop:

Varnost	**Izklop napetosti (obveščanje), zaustavitev prometa po progi (prometnik).**
Zavest	Neodziven – U, pomodrel.
A	Dihalna pot odprta.
B	Brez zaznanega dihanja.
C	Ni tipnih pulzov na centralnih arterijah.
Med oskrbo	
D	GCS 3, glukoza 5,0 mmol/l, zenici enako široki, reaktivni na svetlobo.
E	Električna značka na desni roki in desni nogi, sled električne poti od ramena do desne noge.

Ukrepi:

1. Zavest: neodziven, sled električne značke na rokah.
2. Pričnemo s stisi prsnega koša in umetno ventilacijo 30 : 2.
3. Aktiviramo VUZ z zdravnikom.
4. Odstranimo oblačila.
5. Namestimo AED elektrode/uporabimo klasičen defibrilator.
6. Na monitorju ritem, ki potrebuje električni sunek – VF.
7. Polnjenje 200 J (med polnjenjem stisi prsnega koša).
8. Varnost, umik, proženje.
9. Nadaljujemo TPO – 2 minuti.
10. Vzpostavitev proste i.v. poti, infuzija 0,9 % NaCl 500 ml.
11. Oskrba dihalne poti – I-gel, stisi 100/min – vpihi 10/min, z dodatkom kisika asinhrono.
12. Razmišljamo 4H/4T.
13. **Po 2 minutah** analiza – ritem VF.
14. Polnjenje 300 J (med polnjenjem stisi prsnega koša).
15. Varnost, umik, proženje (umik kisika, če je odprti sistem).
16. Nadaljujemo TPO – 2 minuti.
17. **Po 2 minutah** analiza – **ŠOK NI POTREBEN**.
18. Zaznano dihanje, tipanje pulza – tipen s SF - 90/min.
19. B: Preverjamo dihanje – 16/min, se upira na I-gel.
20. Odstranimo I-gel.
21. D: Zavest – U.

22. Bočni položaj, elektrode ostanejo na pacientu, AED lahko ugasnemo/če klasičen defibrilator nadzor ritma.
23. E: električna značka na desni roki in desni nogi, sled električne poti od ramena do desne noge.
24. Dodatna oskrba (monitoring, EKG) in priprava na transport z ekipo VUZ.

ZAPISKI

SCENARIJ TPO 5/08: ZASTRUPITEV Z OGLJIKOVIM MONOKSIDOM

Klic 112: *»Gasilci so iz požara na objektu rešili nezavestno osebo.«*

Prvi vtis: Moški, star 50 let, leži ob gasilskem vozilu, gasilci so mu že namestili masko s kisikom.

Pristop:

Varnost	**Oseba leži na varnem.**
Zavest	Neodziven – U, rožnate barve v obraz.
A	Dihalna pot odprta.
B	Brez zaznanega dihanja.
C	Ni tipnih pulzov na centralnih arterijah.
Med oskrbo	
D	GCS 3, glukoza 5,3 mmol/l, zenici enako široki, reaktivni na svetlobo.
E	Vidne opekline 1. in 2. stopnje po rokah – namestitev opeklinskih oblog.

Ukrepi:

1. Zavest: neodziven, bil je v zadimljenem objektu.
2. Pričnemo s stisi prsnega koša in umetno ventilacijo 30 : 2.
3. Aktiviramo VUZ z zdravnikom.
4. Odstranimo oblačila.
5. Namestimo AED elektrode – analiza – šok ni potreben.
6. Če klasičen defibrilator – na monitorju ritem, ki ne potrebuje defibrilacije – **asistolija.**
7. Nadaljujemo **TPO – 2 minuti** z visokimi odmerki O_2.
8. Če smo kompetentni: nastavitev i.v. poti, **1 mg adrenalin (1. odmerek)**.
9. Oskrba dihalne poti – I-gel, stisi 100/min – vpihi 10/min, z dodatkom kisika asinhrono.
10. Razmišljamo 4H/4T (toksini).
11. **Po 2 minutah** analiza – ritem PEA.
12. Nadaljujemo TPO – 2 minuti z visokimi odmerki O_2.
13. **Po 2 minutah** analiza – **ŠOK NI POTREBEN**.
14. Če smo kompetentni: nastavitev i.v. poti, **1 mg adrenalin (2. odmerek)**.
15. **Po 2 minutah** analiza – **ŠOK NI POTREBEN** – vidni posamezni vdihi.
16. Tipanje pulza – tipen s SF – 50/min.
17. B: Preverjamo dihanje – 4/min, zavest U. – asistirana ventilacija 12/min s 100 % kisikom.
18. D: Zavest – U, glukoza 5,3 mmol/l, zenici enaki, reaktivni na svetlobo.
19. E – vidne opekline 1. in 2. stopnje po rokah – namestitev opeklinskih oblog.
20. Dodatna oskrba in priprava na transport z ekipo VUZ. (Razmišljajmo o kisikovi hiperbarični komori.)
21. SAMPLE: brez alergij, jemlje zdravila ß-blokerje za srce, drugih podatkov ni mogoče pridobiti.

SCENARIJ TPO 5/09: POŠKODOVANEC

Klic 112: *»Zgodila se je prometna nesreča med motoristom in osebnim vozilom. Nujno je.«*

Prvi vtis: Moški, star 30 let, leži na trebuhu na travniku, nameščeno ima čelado. Motor v bližini je povsem uničen. Gre za bočni trk motorja v osebno vozilo. Ni vidnih deformacij in krvavitev.

Pristop:

- Varnost – leži na varnem.
- Pristop od spredaj, varovanje vratne hrbtenice.
- Zavest – neodziven – U.
- Pregled hrbet – ni zaznanih deformacij.
- Obrat na hrbet na zajemalna nosila ob varovanju vratne hrbtenice.
- Odpiranje vizirja čelade.
- A – dihalna pot delno zaprta, kri v ustih, aspiracija.
- Odstranitev čelade.
- B – ocena dihanja v nevtralnem položaju – 0.
- C – frekvenca 0, ni tipnih pulzov na centralnih arterijah, hudih krvavitev ni vidnih.

Ukrepi:

1. Pričnemo s stisi prsnega koša in umetno ventilacijo 30 : 2.
2. Aktiviramo VUZ z zdravnikom.
3. Odstranimo oblačila.
4. Namestimo AED elektrode – analiza – šok ni potreben.
5. Če klasičen defibrilator – na monitorju ritem brez šoka – PEA.
6. Nadaljujemo **TPO – 2 minuti** s kisikom.
7. Če smo kompetentni: nastavitev i.v. poti, **1 mg adrenalin (1. odmerek)**.
8. Oskrba dihalne poti – I-gel, stisi 100/min – vpihi 10/min z dodatkom kisika asinhrono (**nevtralni položaj glave**).
9. Razmišljamo 4H/4T (hipovolemija, hipoksija, tenzijski pneumotoraks, tamponada).
10. **Po 2 minutah** ocena ritma – PEA – šok ni potreben.
11. Nadaljujemo **TPO – 2 minuti** s kisikom.
12. **Po 2 minutah** ocena ritma – PEA – šok ni potreben.
13. Če smo kompetentni: **1 mg adrenalin (2. odmerek)**.
14. **Po 2 minutah** ocena ritma – PEA – šok ni potreben.
15. Nadaljujemo **TPO – 2 minuti** s kisikom.
16. **Po 2 minutah** ocena ritma – PEA – šok ni potreben (tipen utrip SF - 60/min).
17. B – ocena dihanja – ne diha normalno/umetna ventilacija **10/min**.
18. Oskrba dihalne poti: I-gel/ETI (zdravnik).
19. Hitri travma pregled: na vratu ni zaznanih premikov.
20. Prsni koš – desna stran je nestabilna.
21. Trebuh – mehak.
22. Medenica – je nestabilna.

23. Okončine – desna golen zaprti zlom, ostalo bp, motorike in senzorike ni mogoče oceniti.
24. Privezovanje in imobilizacija glave.
25. Klic helikopterja/poreanimacijska oskrba in priprava na transport.

ZAPISKI

SCENARIJ TPO 5/10: ZAPORA DIHALNE POTI S TUJKOM

Klic 112: *»V bližnji gostilni naj bi se zgrudil mlajši moški.«*

Prvi vtis: Moški, star 40 let, leži na tleh v gostilni na hrbtu, očividci ga pritiskajo na prsni koš.

Pristop:

Varnost	**Varno mesto dogodka, v gostilni.**
Zavest	Neodziven – U, pomodrel.
A	Dihalna pot zaprta, večji kos mesa v žrelu, izvlek z Magilovo prijemalko.
B	Dihanje 0.
C	Frekvenca 0, ni tipnih pulzov na centralnih arterijah.
Med oskrbo	
D	GCS 3, glukoza 9,0 mmol/l, zenici enako široki, reaktivni na svetlobo.
E	Brez sprememb, T – 35 °C.

Ukrepi:

1. Pričnemo s stisi prsnega koša in umetno ventilacijo 30 : 2.
2. Aktiviramo REA ekipo.
3. Odstranimo oblačila.
4. Namestimo AED elektrode – analiza.
5. Če uporabimo klasičen defibrilator – na monitorju ritem, ki ne potrebuje šoka – PEA.
6. **Nadaljujemo TPO – 2 minuti**.
7. **Vzpostavimo prosto vensko pot, ne uspe 2 x, vzpostavimo i.o. pot na goleni (NIO, EZ-IO)**.
8. **Aplikacija adrenalina 1 mg**.
9. **Po 2 minutah** analiza – **ŠOK NI POTREBEN**.
10. Oskrba dihalne poti – I-gel, stisi 100/min – vpihi 10/min z dodatkom kisika asinhrono.
11. Aplikacija tekočine pod pritiskom manšete (300 mmHg)/brizge.
12. **Nadaljujemo TPO – 2 minuti**.
13. Razmišljamo 4H/4T **(hipoksija)**.
14. **Po 2 minutah** analiza – ritem VF.
15. Polnjenje 200 J (med polnjenjem stisi prsnega koša).
16. Varnost, umik, proženje (umik kisika, če odprti sistem).
17. **Nadaljujemo TPO – 2 minuti**.
18. **Aplikacija adrenalina 1 mg**.
19. **Po 2 minutah** analiza – **ŠOK NI POTREBEN**.
20. Zaznano dihanje, tipanje pulza na a. karotis – tipen s frekvenco 90/min.
21. B: Preverjamo dihanje: FD – 16/min, se upira na I-gel.
22. Odstranimo I-gel.
23. D: zavest – U.

24. Bočni položaj, elektrode ostanejo na pacientu, AED lahko ugasnemo.
25. EKG, KT, oksimetrija, temperatura, glukoza.
26. Dodatna oskrba in priprava na transport z ekipo VUZ.

ZAPISKI

SCENARIJI TEMELJNIH IN NAPREDNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA PRI OTROKU

Učni cilji

Po zaključku scenarija bo udeleženec zmožen:

- ☐ razdeliti ključne vloge v timu in uporabiti jasno timsko komunikacijo in komunikacijo s starši;
- ☐ prepoznati klinično sliko in stopnjo ogroženosti otroka;
- ☐ izvesti oceno stanja otroka, pri tem uporabiti strukturiran pristop ABCDE in povezati vitalne znake, anamnezo in prepoznano simptomatiko;
- ☐ določiti prednostno zaporedje ukrepov ter izvesti postopke in posege v okviru kompetenc ali po naročilu zdravnika;
- ☐ zagotoviti kontinuiran monitoring, najavo v sprejemni ustanovi in strukturirano predajo pacienta.

Strokovna priporočila in smernice

Scenariji se nanašajo na priporočila Evropskega reanimacijskega sveta za otroke EPLS 2025 (ang. European Pediatric Life Support).

Splošna vprašanja ob koncu vsakega scenarija

- Kateri podatki so vas najprej usmerili k pravilni prepoznavi kliničnega problema v scenariju?
- Kateri ukrep je bil v prvih minutah časovno najbolj kritičen in zakaj ste ga izvedli v izbranem zaporedju?
- Kje v tem scenariju bi lahko nastala najpomembnejša varnostna napaka in kako bi jo preprečili?
- Kako je potekala razdelitev vlog, komunikacija znotraj tima in predaja informacij ter kaj bi ob ponovitvi scenarija izvedli drugače?

SCENARIJ TPO OTROCI 6/01: SRČNI BOLNIK

Klic 112: *»Otrok, star 2 leti, se ne odziva. Čaka na operacijo srca.«*

Prvi vtis: Fantek, star 2 leti (12 kg), leži na kavču, pomodrel v obraz.

Pristop:

- **Varnost.**
- **Zavest**: prijem za čelo, se ne odzove na tresenje in klicanje, niti na bolečinski dražljaj.
- **A**: prosta.
- **B**: dihanje ni prisotno.
- **C**: centralni utrip karotidno ni tipen.

Med oskrbo

- **D**: zenici široki, reaktivni, glukoza – 5,0 mmol/l.
- **E**: temperatura 36,0 °C

Ukrepi:

1. Aktiviramo reanimacijski team/NMP.
2. Otroka namestimo v hrbtni položaj, napravimo 5 učinkovitih vpihov z dihalnim balonom, ni izboljšanja.
3. Pričnemo s stisi prsnega koša (ena roka na spodnjo polovico prsnice) in umetno ventilacijo 15 : 2.
4. Namestimo AED elektrode; namestimo elektrode defibrilatorja.
5. **Analiza srčnega ritma,** na monitorju **VF**.
6. Polnjenje **50 J** (med polnjenjem stisi prsnega koša).
7. Varnost, umik, proženje (umik kisika, če je odprti sistem).
8. **Nadaljujemo TPO – 2 minuti**.
9. Vzpostavitev proste **venske/IO poti**, uporaba 0,9 % NaCl 10 ml/kg = **120 ml**.
10. Nadaljujemo 2 minuti TPO – izvajanje stisov prsnega koša in umetne ventilacije z dihalnim balonom 500 ml ter dodanim kisikom.
11. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – VF**.
12. Polnjenje **50 J** (med polnjenjem stisi prsnega koša).
13. Varnost, umik, proženje (umik kisika, če je odprti sistem).
14. **Nadaljujemo TPO – 2 minuti**.
15. Dihalna pot: če smo kompetentni, vstavimo I-gel **št. 2**/izvedba ETI, **št. tubusa 4,5**.
16. **Priklop kapnometrije 30 mmHg**.
17. TPO – neodvisno stisi 100–120/min; ventilacija **20**/min.
18. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – VF**.
19. Polnjenje defibrilatorja s **50 J** (med polnjenjem stisi prsnega koša).
20. **Nadaljujemo TPO – 2 minuti**.
21. **Aplikacija adrenalina 0,01 mg/kg = 0,12 mg i.v**.
22. **Aplikacija Amiodarona 60 mg i.v. (5 mg/kg)**.
23. **Razmišljamo 4H/4T –** hipoksija, hipovolemija (odpoved črpalke).
24. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – sinusni ritem 140/min**.

25. Tipanje utripa na a. carotis – utripi tipni – prekinitev stisov prsnega koša.
26. Ocena dihanja – ne diha.
27. Umetna ventilacija preko I-gel/ETI – 20/min.
28. Preklop na ventilator: Vt = 85 ml, tlak = 20 cmH_2O, FiO_2 = 100 %.
29. Snemanje EKG – sinusna tahikardija.
30. Ustrezen položaj in nadzor pacienta.
31. Predaja ekipi z zdravnikom.

ZAPISKI

SCENARIJ TPO OTROCI 6/02: ANAFILAKSIJA

Klic 112: *»Otrok, star 3 leta, je dobil anafilaktično reakcijo na antibiotik.«*

Prvi vtis: Fantek, star 3 leta (14 kg), leži na tleh, na koži vidne urtike, agonalno diha, oteklina obraza in sluznic.

Pristop:

- **Varnost.**
- **Zavest**: položaj na hrbet, prijem za čelo, se ne odzove na tresenje in klicanje, niti na bolečinski dražljaj.
- **A**: prosta.
- **B**: dihanje ni prisotno.
- **C**: centralni utrip karotidno ni tipen.

Med oskrbo

- **D**: zenici široki, reaktivni, glukoza – 5,0 mmol/l.
- **E**: temperatura 36,0 °C.

Ukrepi:

1. Aktiviramo reanimacijski team/NMP.
2. Otroka namestimo v hrbtni položaj, napravimo 5 učinkovitih vpihov z dihalnim balonom 1000 ml, ni izboljšanja.
3. **Pričnemo s stisi prsnega koša (z eno roko na spodnjo polovica prsnice) in umetno ventilacijo 15 : 2**.
4. Namestimo AED elektrode; namestimo elektrode defibrilatorja.
5. **Analiza srčnega ritma, na monitorju PEA**.
6. Nadaljujemo **2 minuti TPO** – izvajanje stisov prsnega koša in umetne ventilacije z dihalnim balonom 1000 ml ter dodanim kisikom.
7. Vzpostavitev proste **venske/IO poti**, uporaba NaCl 10 ml/kg = **140 ml.**
8. **Aplikacija adrenalina 0,01 mg/kg = 0,14 mg i.v**.
9. Nadaljujemo **2 minuti TPO** – izvajanje stisov prsnega koša in umetne ventilacije z dihalnim balonom 500 ml ter dodanim kisikom.
10. Dihalna pot: če smo kompetentni, vstavimo I-GEL **št. 2**/izvedba ETI **št. 4,5.**
11. **Priklop kapnometrije 25 mmHg**.
12. TPO – neodvisno stisi 100–120/min; umetna ventilacija **20**/min.
13. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – PEA**
14. **Nadaljujemo TPO – 2 minuti.**
15. **Razmišljamo 4H/4T –** hipoksija, hipovolemija (anafilaksa).
16. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – PEA.**
17. **Aplikacija adrenalina 0,01 mg/kg = 0,14 mg i.v.**
18. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – sinusna tahikardija 140/min.**
19. Utripi tipni na a. carotis.
20. ABCDE ocena (dihanje je učinkovito – izvedba RSI ali odstranitev I-gela/tubusa).
21. Ocena zavesti – U.
22. Ustrezen položaj in nadzor pacienta, priprava na transport, HNMP.
23. Predaja ekipi z zdravnikom.

SCENARIJ TPO OTROCI 6/03: DEHIDRACIJA

Klic 112: *»Dojenčka, starega 6 mesecev, ne morejo zbuditi. Imel je povišano temperaturo, odvajal tekoče blato, zadnji dan je zavračal pitje mleka.«*

Prvi vtis: Deklica, stara 6 mesecev (7 kg), leži v maminem naročju, koža bleda, otrok se ne odziva.

Pristop:

- **Varnost.**
- **Zavest**: položaj na hrbet, prijem za čelo, se ne odzove na tresenje in klicanje, niti na bolečinski dražljaj.
- **A**: nevtralni položaj – prosta.
- **B**: dihanje ni prisotno.
- **C**: centralni utrip brahialno ni tipen.

Med oskrbo

- **D**: zenici široki, reaktivni, glukoza – 2,0 mmol/l.
- **E**: temperatura 38,0 °C.

Ukrepi:

1. Aktiviramo reanimacijski team/NMP.
2. Dojenčka namestimo v hrbtni položaj, napravimo 5 učinkovitih vpihov z dihalnim balonom 500 ml, ni izboljšanja.
3. **Pričnemo s stisi prsnega koša (objem prsnega koša - palci na spodnji polovici prsnice) in umetno ventilacijo 15 : 2**.
4. Namestimo AED elektrode; namestimo elektrode defibrilatorja (AP pozicija).
5. **Analiza srčnega ritma, na monitorju asistolija**.
6. Nadaljujemo **2 minuti TPO**.
7. Vzpostavitev proste **venske/IO poti**, uporaba NaCl 10 ml/kg = **70 ml**.
8. **Aplikacija adrenalina 0,01 mg/kg = 0,14 mg i.v**.
9. Korekcija hipoglikemije: **20 ml 10 % glukoze**. (odmerek 3 ml 10 % glukoze/kg).
10. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – PEA**.
11. Nadaljujemo 2 minuti TPO – izvajanje stisov prsnega koša in umetne ventilacije z dihalnim balonom 500 ml ter dodanim kisikom.
12. Dihalna pot: če smo kompetentni, vstavimo I-gel **št. 1**/izvedba ETI s tubusom **št. 3,5.**
13. **Priklop kapnometrije 35 mmHg**.
14. TPO – neodvisno stisi 100–120/min; umetna ventilacija **25**/min.
15. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – PEA**.
16. **Nadaljujemo TPO – 2 minuti**.
17. **Aplikacija adrenalina 0,01 mg/kg = 0,14 mg i.v**.
18. **Razmišljamo 4H/4T –** hipovolemija.
19. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – sinusna tahikardija 180/min**.
20. Utripi tipni na a. brachialis.
21. ABCDE ocena (dihanje ni prisotno, umetna ventilacija z ventilatorjem: Vt = 50 ml, frekvenca 25/min.

22. Ocena zavesti – U.
23. Ustrezen položaj in nadzor pacienta, priprava na transport, HNMP.
24. Predaja ekipi z zdravnikom.

ZAPISKI

SCENARIJ TPO OTROCI 6/04: POPOLNA ZAPORA DIHALNE POTI S TUJKOM

Klic 112: *»Dojenček, star 10 mesecev, se duši, potem ko so ga hranili s kuhanim krompirjem in korenčkom.«*

Prvi vtis: Dečka, starega 10 mesecev, starši stresajo z glavo navzdol in mu poskušajo s prsti odstraniti hrano iz ust.

Pristop:

- **Varnost**.
- **Zavest**: položaj na hrbet, prijem za čelo, se odziva na tresenje in klicanje, gleda, se slini, premika roke, ne joče, napenja pomožne mišice.
- **Pogled v usta**: hrane ne dosežemo.
- Počepnemo bližje k tlom, otroka položimo na podlaket s trebuhom in glavo navzdol ter izvedemo **do 5 udarcev med lopatici** – če ni izboljšanja, otroka položimo na hrbet in izvedemo **do 5 pritiskov na prsnico** s tehniko objema.
- Med postopkom se otrok preneha odzivati: AVPU – **U**.
- **A**: nevtralni položaj – če je v ustih hrana, jo odstranimo z Magilovo prijemalko.
- **B**: dihanje ni potrebno ocenjevati, vzrok hrana – glej algoritem.
- **C**: centralni utrip brahialno ni tipen.

Med oskrbo


- **D**: zenici široki, reaktivni, krvni sladkor – 6,0 mmol/l.
- **E**: temperatura 36,0 °C.

Ukrepi:

1. Aktiviramo reanimacijski team/NMP.
2. Po odstranitvi hrane iz ust namestimo dojenčka v hrbtni položaj, glavo namestimo v nevtralni položaj, napravimo 5 učinkovitih vpihov z dihalnim balonom 500 ml, ni izboljšanja.
3. **Pričnemo s stisi prsnega koša (objem prsnega koša – s palci pritiskamo na spodnjo polovico prsnice) in izvajamo umetno ventilacijo 15 : 2**.
4. Namestimo AED elektrode; namestimo elektrode defibrilatorja (AP pozicija).
5. **Analiza srčnega ritma, na monitorju PEA s frekvenco 25/ min, ORS široki (pulz ni tipen)**.
6. Nadaljujemo **2 minuti TPO**.
7. Vzpostavitev proste **venske/IO poti**, uporaba 0,9 % NaCl 10 ml/kg = **100 ml**.
8. **Aplikacija adrenalina 0,01 mg/kg = 0,10 mg i.v. – redčenje 1 mg Adrenalina/9 ml NaCl**.
9. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – PEA (pulz ni tipen)**.
10. Nadaljujemo 2 minuti TPO – izvajanje stisov prsnega koša in umetne ventilacije z dihalnim balonom 500 ml ter dodanim kisikom.
11. Dihalna pot: če smo kompetentni, vstavimo I-gel **št. 1**/izvedba ETI s tubusom **št. 4 (fizično odstranimo ostanke hrane – Magilova prijemalka, aspiracija z Yancoverjevo cevko)**.
12. **Priklop kapnometrije: 30 mmHg**.
13. TPO – neodvisno stisi 100–120/min; ventilacija **25**/min.
14. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – PEA**.
15. **Nadaljujemo TPO – 2 minuti**.

16. **Aplikacija adrenalina 0,01 mg/kg = 0,10 mg i.v**.
17. **Razmišljamo 4H/4T –** hipoksija.
18. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – sinusna tahikardija 160/min**.
19. Utripi tipni na a. brachialis.
20. ABCDE ocena (dihanje ni prisotno, umetna mehanska ventilacija z ventilatorjem: Vt = 50 ml, frekvenca 25/min.
21. Ocena zavesti – U.
22. Ustrezen položaj in nadzor otroka, priprava na transport, HNMP.
23. Predaja ekipi z zdravnikom.

DISKUSIJA



Slika 12: Algoritem ukrepov ob zapori dihalne poti pri otrocih

Vir: Kešpert, 2022.

ZAPISKI

SCENARIJ TPO OTROCI 6/05: UTOPLJEN OTROK

Klic 112: *»V domačem bazenu se je utopil 5-letni deček (18 kg). Starši so ga že izvlekli iz vode in ga menda oživljajo. V vodi je bil najden obrnjen na trebuhu.«*

Prvi vtis: Deček, star 5 let, leži na dvorišču, starši ga stimulirajo z brisačo.

Pristop:

- **Varnost**.
- **Zavest**: namestitev v položaj na hrbet, prijem za čelo, se ne odziva na tresenje in klicanje – U.
- **A**: pogled v usta – nekaj tekočine in sline – aspiracija zgornje dihalne poti.
- **B**: ocena dihanja – ne diha.
- **C**: centralni utrip karotidno ni tipen.

Med oskrbo

- **D**: zenici široki, reaktivni, glukoza – 4,8 mmol/l.
- **E**: temperatura 35,0 °C.

Ukrepi:

1. Aktiviramo reanimacijski team/NMP.
2. Po aspiraciji napravimo 5 učinkovitih vpihov z dihalnim balonom 1000 ml, ni izboljšanja.
3. **Pričnemo s stisi prsnega koša z eno roko (spodnja polovica prsnice) in umetno ventilacijo 15 : 2 z dodatkom 100 % kisika**.
4. Namestimo AED elektrode; obrišemo površino prsnega koša, namestimo elektrode defibrilatorja (AP pozicija).
5. **Analiza srčnega ritma, na monitorju asistolija.**
6. Nadaljujemo **2 minuti TPO**.
7. Vzpostavitev proste **venske/IO poti**, uporaba 0,9 % NaCl 10 ml/kg = **180 ml**.
8. **Aplikacija adrenalina 0,01 mg/kg = 0,18 mg i.v. – redčenje 1 mg/9 ml NaCl**.
9. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – asistolija**.
10. Nadaljujemo 2 minuti TPO – izvajanje stisov prsnega koša in umetne ventilacije z dihalnim balonom 500 ml ter dodanim kisikom.
11. Dihalna pot: če smo kompetentni, vstavimo I-gel **št. 1**/izvedba ETI s tubusom **št. 5 (potrebna aspiracija)**.
12. **Priklop kapnografije: 40 mmHg**.
13. TPO – neodvisno stisi 100–120/min; umetna mehanska ventilacija **20**/min.
14. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – PEA**.
15. **Nadaljujemo TPO – 2 minuti.**
16. **Aplikacija adrenalina 0,01 mg/kg = 0,18 mg i.v**.
17. **Razmišljamo 4H/4T –** hipoksija.
18. **Po 2 minutah analiza srčnega ritma – sinusna tahikardija 120/min**.
19. Utripi tipni na a. brachialis.
20. ABCDE ocena (dihanje prisotno – 18/min, SF – 120/min, KT – 95/50 mmHg).

21. Ocena zavesti – U.
22. Ustrezen položaj in nadzor otroka, priprava na transport, HNMP.
23. Predaja ekipi z zdravnikom.

ZAPISKI

LITERATURA

Alson, R., Han, K., & Campbell, J. (2019). *International trauma life support for emergency care provider* (9. izd.). Pearson education.

Andolšek, D. (2024). Tehniki urgentnega in hitrega iznosa poškodovanca iz vozila. In Posavec (ed.) *Sodobna imobilizacija v predbolnišničnem okolju* (str. 111–118). Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu. https://zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/SODOBNA-IMOBILIZACIJA-V-PREDBOLNISNICNEM-OKOLJU-2024-stisnjena-datoteka.pdf

Djakow, J., McBeth Turnerd, N., Skellettf, S., Buysse, C., Cardonah, F., De Lucas, N., Del Castillo, J., Kivirantak, P., Lauridsenl, K. G., Markeln, F., Martinez-Mejias, A., Roggenp, I., & Biarent, D. (2025). European Resuscitation Council Guidelines 2025 Paediatric Life Support. *Resuscitation*, 215, 1-67. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2025.110767

Grošelj Grenc, M., Strdin Košir, A., Gradišek, P., Perme, T., Vilman, J., Granda, A., Kaplan, P., Gruenfeld, M., Baznik, Š., Jenko, M., Uštar Kalan, K., Makota, A., Mohar, A., Možina, H., Najdenov, P., Pelcl, T., Poredoš, P., Radšel, P., Vlahovič, D., & Zelinka, M. (2026). *Smernice Evropskega sveta za oživljanje 2025 – slovenska izdaja* (1. izd.). Slovensko združenje za urgentno medicino. https://slors.szum.si/wp-content/uploads/2026/02/smernice-za-ozivljanje-2025-prva_verzija-1.pdf

Lott, C., Truhlář, A., Alfonzo, A., Barelli, A., González-Salvado, V., Hinkelbein, J., Nolan, J. P., Paal, P., Perkins, G. D., Thies, K.-C., Yeung, J., Zideman, D. A., Soar, J., Khalifa, G. E. A., Álvarez, E., Barelli, R., Bierens, J. J. L. M., Boettiger, B., Brattebø, G., … Schmitz, J. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances. *Resuscitation*, *161*, 152–219. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.011

Madar, J., Roehr, C. C., Ainsworth, S., Ersdal, H., Morley, C., Rüdiger, M., Skåre, C., Szczapa, T., Te Pas, A., Trevisanuto, D., Urlesberger, B., Wilkinson, D., & Wyllie, J. P. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Newborn resuscitation and support of transition of infants at birth. *Resuscitation*, *161*, 291–326. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.014

Mentzelopoulos, S. D., Couper, K., Voorde, P. V. D., Druwé, P., Blom, M., Perkins, G. D., Lulic, I., Djakow, J., Raffay, V., Lilja, G., & Bossaert, L. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Ethics of resuscitation and end of life decisions. *Resuscitation*, *161*, 408–432. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.017

Nolan, J. P., Sandroni, C., Böttiger, B. W., Cariou, A., Cronberg, T., Friberg, H., Genbrugge, C., Haywood, K., Lilja, G., Moulaert, V. R. M., Nikolaou, N., Mariero Olasveengen, T., Skrifvars, M. B., Taccone, F., & Soar, J. (2021). European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine Guidelines 2021: Post-resuscitation care. *Resuscitation*, *161*, 220–269. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.012

Smyth, M. A., Van Goor, S., Hansen, C. M., Fijačko, N., Nakagawa, N. K., Raffay, V., Ristagno, G.,Rogers, J., Scquizzato, T., Smith, C. M., Spartinou, A., Wolfgang, K., & Perkins, G. D. (2025). European Resuscitation Council Guidelines 2025 Adult Basic Life Support. *Resuscitation*, *215*,110771. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2025.110771

Soar, J., Böttiger, B. W., Carli, P., Jiménez, F. C., Cimpoesu, D., Cole, G., Couper, K., D'Arrigo,S., Deakin, C. D., Ek, J. E., Holmberg, M. J., Magliocca, A., Nikolaou, N., Paal, P., Pocock, H., Sandroni, C., Scquizzato, T., Skrifvars, M. B., Verginella, F., … Nolan, J. P. (2025). European Resuscitation Council Guidelines 2025 Adult Advanced Life Support. *Resuscitation*, *215*, 110769. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2025.11076

Van De Voorde, P., Turner, N. M., Djakow, J., De Lucas, N., Martinez-Mejias, A., Biarent, D., Bingham, R., Brissaud, O., Hoffmann, F., Johannesdottir, G. B., Lauritsen, T., & Maconochie, I. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Paediatric Life Support. *Resuscitation*, *161*, 327–387. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.015